

毛。叶厚革质，半宿存，椭圆形或倒卵状椭圆形，长1—2.5厘米，宽5—13毫米，先端短渐尖，基部宽楔形或近于圆形，边缘增厚而反卷，上面深绿色，疏被糙伏毛，下面淡绿色，被褐色糙伏毛，中脉在两面稍凸出，侧脉不明显，被糙伏毛；叶柄长2—4毫米，密被褐色糙伏毛。伞形花序顶生，常有花6—8朵；花梗长3—4毫米，密被深褐色糙伏毛；花萼裂片极不明显，密被糙伏毛；花冠淡紫色，狭漏斗形，连同管长1.6厘米，花冠管长8毫米，裂片5，长圆形，长8毫米；雄蕊5，长1.7厘米，伸出花冠外，花丝白色，中部以下被微柔毛；花药深褐色；子房卵球形，长约3毫米，被绢状绒毛和糙伏毛，花柱长约1厘米，比雄蕊短，无毛。蒴果卵球形，长5毫米，密被深褐色糙伏毛。花期3月，果期7—8月。

产广东西部和南部。生于海拔900米的山顶附近。模式标本采自广东高要（鼎湖山鸡笼山顶附近）。

本种与山岭南杜鹃 *R. mariae* Hance 相近，但不同在于本种的叶系椭圆形或倒卵状椭圆形；雄蕊比花柱长，特别突出，易于区别。

298. 大埔杜鹃 (广东药物学会) 图版 126: 1

Rhododendron taipaoense T. C. Wu et Tam in Med. Mat. Guangdong 4: 36. f. 5. 1978, 华南杜鹃花志 35 et 98. 1983.


灌木，高1—1.5米；小枝密集，灰褐色，密被淡灰色绢状刚毛，混生腺头短柔毛。叶革质，椭圆形、长圆形，稀长圆状椭圆形，长2.5—6.5厘米，宽1—3厘米，先端短尖、钝或锐尖，基部楔形，稀宽楔形，边缘明显反卷，全缘或呈浅波状，上面绿色，干后黄褐色，幼时密被黄褐色毡毛状糙伏毛，后近无毛，下面淡绿色，密被灰白色糙伏毛，中脉在上面下凹，下面凸出，密被短刚毛和糙伏毛，侧脉5—7对，在下面明显，未达叶缘网结；叶柄长5—10毫米，密被淡灰色绢状刚毛和腺头柔毛。伞形花序顶生，密集，有花达7—10朵以上；花梗长6毫米，密被锈色糙伏毛；花萼裂片小，常呈细圆齿状，被锈色糙伏毛；花冠红色，狭漏斗形，长1.8厘米，花冠管圆筒状，长1厘米，径仅2毫米，裂片5，长圆状线形，先端尖，长8毫米，宽约3毫米，开展；雄蕊5，不等长，长2.6—2.8厘米，花丝丝状，无毛，花药长2毫米；子房卵球形，长2毫米，密被糙伏毛，花柱长2.5厘米，比雄蕊短，无毛。蒴果卵珠形，长3—4毫米，被深红褐色糙伏毛。花期6月，果期8—9月。

产广东东部和东北部。生于海拔700—800米的山地疏林或灌丛中。模式标本采自广东大埔（古村石窑坑）。

本种与茶绒杜鹃 *R. rufulum* Tam 相似，但本种的花序有花达7—10朵以上；花萼裂片细圆齿状；花冠裂片长圆状线形，先端尖锐；花柱长2.5厘米，比雄蕊短，易于区别。

299. 荔枝杜鹃 (广东药物学会)

Rhododendron litchiifolium T. C. Wu et Tam in Mat. Med. Guangdong 4:



图版 126 1. 大埔杜鹃 *Rhododendron taipacense* T. C. Wu et Tam: 花枝。2—3. 南边杜鹃 *Rhododendron merionale* Tam var. *maridionale*: 2. 花枝; 3. 花的剖面, 示花冠、雄蕊和雌蕊。4—6. 背绒杜鹃 *Rhododendron hypoblematosum* Tam: 4. 花枝; 5. 花外观; 6. 雄蕊和雌蕊。(陈 笏绘)