

Rhododendron jasminoides M. Y. He in Journ. Sichuan Univ. Nat. Sci. ed. 1984(1): 93. 1984.

灌木，高达5米；幼枝淡褐色或褐色，具腺头短刚毛；老枝灰褐色，近于无毛。叶薄革质，集生枝顶，椭圆形或椭圆状卵形，长4.5—8厘米，稀达9.5厘米，宽2.5—4.5厘米，先端渐尖，基部宽楔形，边缘近于全缘，上面深绿色，干后深褐色，近于无毛，下面淡褐色，散生棕褐色短刚毛，中脉在上面凹陷，下面显著凸起，侧脉5—8对，常未达叶缘消失不见。伞形花序顶生，有花10—12朵；花梗长0.8—1厘米，密被棕褐色绢状糙伏毛；花萼裂片小，三角状卵形，密被棕褐色短刚毛；花冠狭漏斗形，粉红色，长2厘米，花冠管圆筒状，长1.1厘米，直径3毫米，内外两面无毛，裂片5，卵形，长9毫米，无紫色斑点；雄蕊5，不等长，长1.9—2.7厘米，伸出花冠外，花丝扁平，无毛，花药长圆形，长约3毫米；子房卵球形，长3毫米，密被棕褐色短刚毛，花柱长2—2.2厘米，常比雄蕊短，淡紫色，无毛，柱头褐色，头状。果未见。花期4—5月。

产广西东部。生于山地林中。模式标本采自广西金秀瑶族自治县金田大队。

本种与广东杜鹃 *R. kwangtungense* Merr. et Chun 相似，但本种的花柱常比雄蕊短；花萼裂片较小，三角状卵形；花冠管的内外两面及花丝均无毛，易于区别。

304. 龙岩杜鹃 (新拟) 繁花杜鹃 (植物研究)

Rhododendron florulentum Tam in Bull. Bot. Res. 2(4): 80. Pl. 2. 1982, 华南杜鹃花志 37 et 99. 1983.

灌木；小枝较粗壮，圆柱形，红褐色，被开展的锈色短刚毛和腺头刚毛。叶革质，卵形或椭圆形至椭圆状卵形，不等大，长2.2—8.5厘米，宽1—4.5厘米，通常长5.8厘米，宽3厘米，先端略尖锐，有时微缺，基部宽楔形或近于圆形，上面疏被银色柔毛，下面密被淡黄褐色绵毛及锈色糙伏毛，侧脉约6对，被糙伏毛；叶柄粗壮，长6—10毫米，被开展的锈色短刚毛及腺头刚毛。伞形花序顶生，通常有花12—14朵；花梗长0.9—1.3厘米，密被亮色糙伏毛；花萼小，杯状，裂片三角形，先端短尖，被糙伏毛；花冠管状漏斗形，淡红色，长2.5厘米，裂片5，狭长圆形或披针状长圆形，长1.2厘米，宽4毫米，顶端短渐尖，边缘浅波状；雄蕊5，不等长，长2.5—2.8厘米，大多数较花柱长，花丝无毛；子房卵球形，长3毫米，密被糙伏毛，花柱纤细，长2.3厘米，无毛。花期5月。

产福建西南部。生于山坡灌丛或杂木林内。模式标本采自福建龙岩（颜中大队）。

305. 垂钩杜鹃 (植物研究)

Rhododendron unciferum Tam in Guihaia 2(2): 73. f. 5. 1982, 华南杜鹃花志 50 et 104. 1983.

灌木；枝圆柱形，近于轮生，灰褐色，初时密被锈色糙伏毛，后近于无毛且粗糙。叶革质，密集于枝端，卵形或椭圆状卵形，通常长1.5—2.5厘米，稀达3.2厘米，宽约1—1.7厘米，先端短尖，基部宽楔形或近于圆形，边缘反卷，有细圆齿，上面绿色，除中脉