

产广西东部。生于海拔 1000 米的亚高山疏林中。模式标本采自广西贺县（姑婆山）。

本种与小花杜鹃 *R. minutiflorum* Hu 相近，但本种的花较大，花冠长 9 毫米，雄蕊长 1.4—1.7 厘米，花柱长 2 厘米，中部以下被糙伏毛。

未见模式标本，基本上照原文译出，在书写的规格及区别特征上有所不同。

334. 小花杜鹃（中国植物学会杂志） 细花杜鹃（中国植物图谱），细榴花（广东）图版 133: 5—8

*Rhododendron minutiflorum* Hu in Journ. Arn. Arb. 12: 155. 1931; 胡先骕、陈焕镛，中国植物图谱 3: Pl. 148. 1933; Fang in Journ. Bot. Soc. China 2(2): 615. 1935; 陈嵘，中国树木分类学 950. 1937; Rehd. in Stevenson, Spec. Rhodod. 92A. 1947; 中国高等植物图鉴 3: 152. 图 4257. 1974; 华南杜鹃花志 65. 1983.

直立灌木，高达 3 米；分枝密集，近于轮生，密被红褐色扁平糙伏毛；老枝干后深褐色或灰褐色，无毛或近于无毛。叶革质，4—5 枚集生枝端，长圆形至倒卵形或阔卵形，长 0.8—1.5 厘米，宽 3—5 毫米，先端尖锐，具短尖头，基部楔形，边缘反卷，具细圆齿和糙伏毛，上面绿色，初时散生红褐色糙伏毛，后无毛，下面淡绿色，除沿中脉疏被红褐色扁平糙伏毛外，其余无毛，中脉在上面微凹陷，下面微凸起，侧脉和细脉在两面不明显；叶柄长 2—3 毫米，密被红褐色扁平糙伏毛。花芽较小，鳞片卵形，两面无毛。伞形花序顶生，常具花 3 朵，与叶同时开放；花梗长 4—6（—8）毫米，密被红褐色扁平糙伏毛；花萼小，裂片 5，圆形，被红褐色糙伏毛；花冠白色，淡紫色或紫色，辐状漏斗形，长 6 毫米，径约 7 毫米，裂片 5，开展，卵形，长 3 毫米，无毛，花冠管长 3 毫米，外面被淡红色腺毛，内面被白色微柔毛；雄蕊 5，近于等长，长约 7 毫米，略伸出花冠外，花丝扁平，近基部被微柔毛；子房卵球形，长 3 毫米，密被红棕色糙伏毛，花柱比雄蕊长，长 8 毫米，中部以下疏被短腺毛。蒴果长 3 毫米，密被扁平糙伏毛。花期 4—5 月，果期 6—8 月。


产广东北部、广西南部、中部、北部和东北部。生于海拔 1120—1430 米的丘陵地区。模式标本采自广西罗城。

本种同两广杜鹃 *R. tsoi* Merr. 相似，但不同在于本种的叶长圆形至倒卵形或阔卵形，边缘具细圆齿；花冠白色、淡紫色或紫色，长 6 毫米，花冠管外面被淡红色腺毛；雄蕊伸出花冠外，易于区别。

335. 龙山杜鹃（中国树木分类学） 宿柱杜鹃（中国高等植物图鉴），陈氏杜鹃（中国植物学会杂志）

*Rhododendron chunii* Fang in Journ. Bot. Soc. China 2(2): 615. 1935; 陈嵘，中国树木分类学 950. 1937; Fang in Sunyatsenia 7: 1. 1948; 中国高等植物图鉴 3: 152. 图 4258. 1974; 华南杜鹃花志 62. 1983.

半常绿灌木，高 1—2（—6）米；幼枝细长，褐色或深褐色，密被棕褐色糙伏毛；老



图版 133 1—4. 阳明山杜鹃 *Rhododendron yangmingshanense* Tam: 1. 花枝; 2. 花; 3. 雄蕊; 4. 雌蕊。5—8. 小花杜鹃 *Rhododendron minutiflorum* Hu: 5. 植株; 6. 花; 7. 雄蕊; 8. 雌蕊。9—11. 毛果杜鹃 *Rhododendron seniavinii* Maxim.: 9. 花枝; 10. 花剖面; 11. 雄蕊。(李 健绘)