

本种与滇红毛杜鹃 *R. rufo-hirtum* Hand.-Mazz. 相近, 但本种的叶较大, 长 4—6 (—10—14) 厘米, 宽稀达 7.5 厘米, 仅下面散生糙伏毛; 花冠较短, 长 1.7—1.9 厘米, 花柱长 2.4—2.9 厘米, 从基部向上长 6 毫米被糙伏毛, 易于区别。

346. 腊黄杜鹃 (华南杜鹃花志) 秆黄杜鹃 (植物研究)

Rhododendron subcerinum Tam in Bull. Bot. Res. 2(4): 88. f. 1. 1982, 华南杜鹃花志 61 et 109. 图 10. 1983.

灌木; 高 1—2 米; 枝灰色, 幼时密被灰褐色糙伏毛。叶革质, 集生小枝顶端, 倒卵形或倒卵状椭圆形, 稀为狭椭圆形, 长 2.5—5.5 厘米, 宽 2—2.5 厘米, 有时更狭, 宽仅 5—10 毫米, 先端急尖, 有短尖头, 基部楔形或狭楔形, 边缘反卷, 上面深绿色, 干后秆黄色, 下面淡绿色, 两面散生糙伏毛, 毛基部呈蜂巢状的孔, 中脉在上面微凸起, 下面显著凸起, 被糙伏毛, 侧脉在上面显著凹陷, 斜升, 未达叶缘连结; 叶柄长约 3—5 毫米, 初时疏被糙伏毛, 后近无毛。花芽鳞片卵形, 长约 1.7 厘米, 被黄褐色绢状糙伏毛, 边缘被睫毛。伞形花序顶生, 有花约 6 朵; 花梗长 0.6—1 厘米, 被黄褐色糙伏毛; 花萼杯状, 裂片三角形, 被糙伏毛; 花冠红色, 漏斗状钟形, 长 2 厘米, 花冠管圆筒状, 长 9 毫米, 直径 4 毫米, 裂片 5, 匙形, 开展, 长 1.1 厘米; 雄蕊 5, 不等长, 伸出花冠外, 花丝扁平, 白色, 被微柔毛; 子房圆锥状, 被锈色糙伏毛, 花柱长 2.4 厘米, 下面 1/3 被糙伏毛。蒴果椭圆状, 长 1 厘米, 被灰褐色糙伏毛。花期 10 月。

产广东南部。模式标本采自广东阳春仙家洞。

未见模式标本, 照原文描述。

347. 忍冬杜鹃 (植物研究)

Rhododendron loniceraeflorum Tam in Bull. Bot. Res. 2(4): 81. Pl. 3. 1982, 华南杜鹃花志 34 et 97. 彩色图版 4. 1983.

灌木, 小枝纤细, 灰褐色, 仅幼时被糙伏毛。叶薄革质, 披针形或长圆状披针形, 通常长 3—5.5 厘米, 宽 0.8—1.6 厘米, 两端尖或渐尖, 有时基部狭楔形, 边缘微反卷, 上面绿色, 疏被红褐色开展、长柔毛状糙伏毛, 下面被薄层绵毛和锈色糙伏毛, 中脉在上面微下凹, 下面隆起, 密被锈色糙伏毛, 侧脉约 6 对, 未达叶缘网结; 叶柄极短, 长仅 3 毫米或近于无柄。伞形花序顶生, 有花 4—6 朵; 花梗长 8.5 毫米, 密被红褐色糙伏毛; 花萼狭盘状, 裂片 5, 三角形, 长 1.5 毫米, 宽 1 毫米, 先端尖, 边缘微啮蚀状; 花冠狭漏斗状, 淡红紫色, 连同管长 3.5 厘米, 花冠管圆筒状, 长 1.8—2.5 厘米, 直径 3—7 毫米, 外面无毛, 内面被微柔毛, 裂片 5, 椭圆状卵形, 长约 1.3 厘米, 宽约 1 厘米, 顶端钝; 雄蕊 5, 近于等长, 花丝长 3.3—3.5 厘米, 中部以下被微柔毛; 子房卵球形, 长 3 毫米, 直径 2.5 毫米, 密被锈色糙伏毛, 花柱细长, 长达 4.2 厘米, 基部疏被糙伏毛, 柱头扁平, 头状。蒴果卵球形, 直径约 4 毫米, 密被糙伏毛, 花柱宿存。花期 4 月。

产福建南部。生于山坡阳地的杂木林中。模式标本采自福建安溪卢田鸿都大队苦田坑。

本种与广西杜鹃 *R. kwangsiense* Hu ex Tam 相近, 但本种的花丝长 3.3—3.5 厘米, 中部以下被微柔毛; 花冠长 1.8—3.5 厘米, 裂片椭圆状卵形, 顶端钝; 花柱长达 4.2 厘米, 基部被稀疏的糙伏毛, 易于区别。

348. 细瘦杜鹃 (植物研究)

Rhododendron tenue Ching ex Fang et M. Y. He in Bull. Bot. Res. 2(2): 87. f. 5. 1982 et in Journ. Rhodod. Spec. Foundation 1: 106. 1984.

灌木; 小枝细瘦, 直径 1—1.5 毫米; 幼枝密被棕褐色糙伏毛, 后近无毛。叶密集枝端, 薄纸质, 椭圆状长卵形, 长 2—5.5 (—10) 厘米, 宽 0.8—1.9 厘米, 极稀达 4.8 厘米, 先端锐尖, 基部宽楔形或近于圆形, 边缘具不明显的钝圆齿, 上面深绿色, 幼时散生棕褐色糙伏毛, 下面淡绿色, 除中脉疏被深棕色扁平糙伏毛外, 其余散生糙伏毛, 中脉在上面下凹, 下面显著凸起, 侧脉 3—6 对, 仅在下面明显, 未达叶缘连结; 叶柄长 2—5 毫米, 稀达 1 厘米, 被棕褐色糙伏毛。伞形花序顶生, 常有花 2—3 朵; 花梗长 4—5 毫米, 密被棕色扁平糙伏毛; 花萼极不发达; 花冠漏斗形, 连同管长 8 毫米, 花冠管长 5 毫米, 内面被微柔毛; 雄蕊 5, 不等长, 3 枚较长的达 1.2 厘米, 2 枚短的微比花冠长, 花丝基部扁平, 被短柔毛; 子房卵球形, 被糙伏毛, 花柱与部分雄蕊等长, 长 1.2 厘米, 中部以下被亮棕褐色糙伏毛, 柱头 5 浅裂。蒴果圆锥形, 长 5—6 毫米, 直径 4 毫米, 密被棕褐色糙伏毛; 果梗长 0.8—1.3 厘米, 被糙伏毛。花期 5—6 月, 果期 7—11 月。

产广西东北部。生于海拔约 1 500 米的山坡密林中。模式标本采自广西兴安 (九区雷公田至塘同)。

组 3. 假映山红组 — Sect. 3. *Tsusiopsis* Sleumer in Engler's Bot. Jahrb. 74: 552. 1949. — Ser. *Azalea* suber. *Tashiroi* sensu Rehd. in Stevenson, Spec. Rhodod. 121. 1930.

枝具伏生扁平短柔毛; 叶常绿, 革质, 2—3 枚轮生枝端; 花同叶枝同时出自一顶生花芽。

本组的模式种: 大武杜鹃 *R. tashiroi* Maxim.

本组只有 1 种。分布于日本南部的九州至琉球群岛。我国台湾西南部大武山有记录。

349. 大武杜鹃 (台湾植物志) 塔西洛杜鹃 (中国植物学会杂志) 图版 135: 7—

11

Rhododendron tashiroi Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. ser. 3, 31: 164. (in Mém. Biol. 12: 489.) 1887; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 31. 1889; Wils. in Journ. Arn. Arb. 6: 171. 1925; Rehd. in Stevenson, Spec. Rhodod. 123. 1930; Fang in Journ. Bot. Soc. China 2(2): 607. 1935; Kanehira, Form. Trees rev. ed. 551. Pl. 509. 1936; 台湾植物志 4: 38. 1978.

常绿灌木, 高 1.5—4 米, 稀达 6 米; 分枝多, 纤细, 幼枝疏被棕褐色柔毛, 后近于