

在两面可见。通常为顶生大圆锥花序,长 15—25 厘米,多花,花序轴与花梗无毛;花白色,小;苞片和小苞片早落;花萼长约 2 毫米,近无毛,5 裂,裂片宽卵形;花冠短钟形,长 2—3 毫米,5 裂,裂片三角状卵形,深裂几达花冠基部,开展,无毛;雄蕊 10 枚,长约为花冠 $1/2$,花丝无毛,中部弯曲;花柱长约 1 毫米,无毛。蒴果扁球形,高约 8 毫米,直径约 10 毫米,具 5 条明显纵棱;种子单侧有翅,长约 4 毫米,宽约 2 毫米。 花期 5—6 月,果期 7—9 月。

产云南。生于海拔 1 200—2 800 米的山坡疏林中。模式标本采自云南思茅。印度、缅甸北部、泰国北部亦有。

《西藏植物志》第三卷记载西藏有本种之分布。当时所见青藏队植被组采自墨脱的标本(无号,藏中国科学院植物研究所生态室),极似本种,但无花果。限于材料,西藏是否有该种,尚存疑。

4. 云南金叶子 云南假木荷(中国高等植物图鉴);细叶子、毒羊叶、马虱子树、疯姑娘、泡花树(云南),假吊钟、美娥、果母(广西),补骨灵、金叶子(云南植物志)

Craibiodendron yunnanense W. W. Smith in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 5: 159. 1912; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 790. 1936; 中国高等植物图鉴 3: 179, 图 4312. 1974; 云南植物志 4: 585. 图版 167, 6—8. 1986; Judd in Journ. Arn. Arb. 67: 453. fig. 4. 1986.

灌木或小乔木,高 3—4 米,稀达 5—6 米;小枝灰褐色,无毛。叶互生,革质,椭圆状披针形,长 4—5(—8)厘米,宽 1.6—2(—3)厘米,先端渐尖,顶端近钝头,基部宽楔形,全缘,表面亮绿色,背面淡绿色并疏生黑褐色腺点,两面无毛,中脉在表面下陷,在背面隆起,侧脉及网脉在两面可见;叶柄长 2—3(—6)毫米,无毛。圆锥花序顶生或腋生,多花,花序轴无毛;花梗粗壮,长约 2 毫米,基部有 1 苞片,中部具 1 小苞片,无毛;花萼 5 深裂,裂片宽卵形,长 1—2 毫米,无毛;花冠钟形,淡黄白色,长约 4.5 毫米,宽约 2.5 毫米,口部缢缩,浅裂为 5 个直立的三角形齿,无毛;雄蕊 10 枚,花丝长为花冠之半,被微毛,中部弯曲;花柱长约 1 毫米,无毛。蒴果球形,高 8—9 毫米,直径约 6 毫米,具 5 棱。种子单侧有翅,长 5—6 毫米,宽 2—3 毫米。 花期 4—7 月,果期 7—10 月。

产广西、云南、西藏(与缅甸相邻地区)。生于海拔(1 200—)1 600—3 200 米的干燥阳处。模式标本采自云南中部。缅甸也有。

全株有麻醉作用,根入药,治跌打损伤,叶有毒。树皮可提取栲胶。

11. 地桂属*——*Chamaedaphne* Moench, nom. conserv.

Moench, Meth. 457. 1794. —*Cassandra* D. Don in Edinb. New Phil. Journ. 17: 158. 1834.

* 地桂属(中国种子植物科属辞典)。湿原蹄盖蕨(植物分类学报,第 2 卷),甸杜属(东北木本植物图志)、矮绿属(种子植物名称)。