

1976. — *G. iioana* Hayata in Bot. Mag. Tokyo 20: 74. 1906; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 682. 1963; 中国高等植物图鉴 3: 184. 图 4322. 1974; 台湾植物志 4: 16. 1978; T. Z. Hsu in Act. Bot. Yunn. 3: 423. 1981. — *G. benguetensis* Copeland in Philip. Journ. Sci. 47: 58. t. 1, f. 4—5. 1932. — *G. repens* auct. non Blume: Hayata in Bot. Mag. Tokyo 20: 18. 1906.

小灌木, 高 10—15 厘米, 分枝较多; 幼枝被白色微柔毛。叶互生, 较密集, 长椭圆形或长卵形, 长 8—13 毫米, 宽 3—5 毫米, 常中部以上较宽, 先端钝圆, 有凸尖, 基部渐狭, 常下延至柄, 边缘有锯齿, 两面无毛, 表面绿色, 背面色较淡, 密被小乳凸和疏具疣点, 侧脉 2—3 对, 连同网脉在表面下陷, 在背面隆起; 叶柄短而粗, 长约 1 毫米。总状花序顶生, 长约 2.5—5 厘米, 有花 5—8 朵; 苞片卵形, 或三角状卵形, 长约 2 毫米; 小苞片 2, 互生于花梗中部和上部, 宽披针形或长椭圆形, 长 1.5—2 毫米, 无毛或近无毛; 花萼 5 裂, 裂片卵形; 花冠白色, 卵状筒形, 长 4—5 毫米, 口部 5 浅裂; 子房被毛。果序长 2.5—5 厘米, 被柔毛, 果梗纤细, 长 4—5 毫米, 无毛或近无毛; 浆果状蒴果球形, 直径约 5 毫米, 密被白色柔毛, 花柱宿存, 无毛; 种子多数。花期 5—6 月, 果期 7—8 月。

产我国台湾中部。生于海拔 2 250—3 600 米的高山空旷草地。菲律宾(吕宋)亦有。

5. 平卧白珠(云南植物研究)

Gaultheria prostrata W. W. Smith in Not. Roy. Gard. Edinb. 11: 210. 1920; T. Z. Hsu in Act. Bot. Yunn. 3: 423. 1981; 云南植物志 4: 589. 1986.

平卧小灌木, 高 10—20 厘米; 枝幼时被柔毛, 老时渐变无毛。叶纸质, 椭圆形, 长 10—12 毫米, 宽 6—8 毫米, 先端钝圆或钝头, 基部宽楔形, 边缘具锯齿, 齿尖具微尖头, 表面亮绿色, 无毛, 背面淡绿色, 疏具黑紫色斑点, 网脉在表面凹入, 在背面明显隆起; 叶柄长约 1 毫米, 无毛。总状花序顶生, 短, 有花 1—3 朵, 序轴被柔毛, 花梗长约 1 毫米; 小苞片 2, 卵形, 长 2—3 毫米, 绿色, 边缘玫瑰红色; 花萼裂片 5, 卵形, 长约 2 毫米, 渐尖; 花冠宽钟形, 白色, 长约 4 毫米, 口部 5 裂, 裂片卵状三角形, 长约 1 毫米; 雄蕊 10 枚, 花丝扁平, 微被柔毛, 花药具 2 芒; 子房球形, 顶部平而中央略凹陷, 具微柔毛, 花柱长约 2 毫米, 无毛。浆果状蒴果蓝黑色。花期 7 月, 果期 8—9 月。

产云南西北部。生于海拔约 4 800 米的山坡上。模式标本采自贡山。

6. 鹿蹄草叶白珠(云南植物研究) 梨叶白珠(中国高等植物图鉴)

Gaultheria pyrolloides Hook. f. et Thoms. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 1: 30. 1863; Hara in Fl. E. Himalaya 235. 1966 et 95. 1971; 云南植物志 4: 590. 1986; 西藏植物志 3: 699. 1986. — *G. pyrolaefolia* Hook. f. ex C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 457. 1882; 中国高等植物图鉴 3: 185. 图 4324. 1974; T. Z. Hsu in Act. Bot. Yunn. 3: 423. 1981.

常绿矮小灌木, 高 9—12 厘米; 枝直立, 被开展的棕色刚毛状长毛。叶椭圆状倒卵形,