

mer in Reinwardtia 4: 179. 1975, in Blumea 11: 1. 1961 et in Fl. Males. I, 6(5): 694. 1967; 台湾植物志 4: 17. 1978.

本变种总状花序短,长 3—5 厘米,有花 3—6 朵。

产江西(井冈山)、福建、台湾、广东、广西、贵州。生于海拔 600—1 100 米的林中。中南半岛、菲律宾和马来西亚亦有。

本变种为本种中分布于低海拔地区的类型。

17e. **硬毛白珠**(云南植物研究)(变种) 硬毛滇白珠(植物分类学报)、金钗(广西)

var. **hirsuta** (D. Fang et N. K. Liang) T. Z. Hsu in Act. Bot. Yunn. 3: 428. 1981; 云南植物志 4: 597. 1986. — *Gaultheria yunnanensis* (Franch.) Rehd. var. *hirsuta* D. Fang et N. K. Liang in Act. Phytotax. Sin. 15: 112. 1977.

本变种枝、花梗密被均匀分布的硬毛,叶边缘被缘毛而特异。

产广东(鼎湖山)、广西、云南中部。生于海拔 1 000—2 800 米的灌丛中或干燥山坡上。模式标本采自广西桂平。

民间用全草入药,治肚痛、疝气。

18. **铜钱叶白珠**(中国高等植物图鉴) 四川白珠树(中国树木分类学) 图版 19: 1—5

Gaultheria nummularioides D. Don, Prodr. Fl. Nep. 150. 1825; Royle. III. Bot. Himal. t. 63. fig. a—e (Aug. 1835) et Pl. 280 (dec. 1835); C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 457. 1882; Koord. Exk.-fl. Java 3: 10. 1912; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 203. 1924; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 793. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学 966. 图 856. 1937; Y. C. Yang in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot. ser. 12(3): 144. 1941; Hara, Fl. E. Himal. 245. 1966; 中国高等植物图鉴 3: 181, 图 4316. 1974; T. Z. Hsu in Act. Bot. Yunn. 3: 430. 1981; 西藏植物志 3: 697, 图 279: 1—6. 1986; 云南植物志 4: 597, 图版 171, 1—3. 1986. — *G. repens* Blume, Bl. Bijdr. Fl. Nederl. Ind. 857. 1826; DC. Prodr. 7(2): 593. 1839. — *G. nummularioides* D. Don var. *elliptica* Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. 1: 555. 1913.

18a. **铜钱叶白珠**(原变种)

var. **nummularioides**

常绿匍匐灌木,高 30—40 厘米;茎细长如铁丝状,多分枝,有棕黄色糙伏毛。叶宽卵形或近圆形,革质,长 8—12(—15)毫米,宽 8 毫米,稀达 10 毫米,先端急尖,基部圆形,或略心形,近全缘,但边缘有小齿形的水囊体,每齿顶端生一棕色长刚毛,老时脱落,表面无毛,叶脉凹入,背面灰绿色,具瘤足状棕色刚毛,老时部分脱落;叶柄短,长 1.5—2 毫米,被黄棕色糙伏毛。花单生于叶腋,下垂;花梗长约 2 毫米;苞片 2 枚,小苞片 2—4,着生于花