

产我国台湾。模式标本采自南投合欢山。

标本未见,描述据原记载。

13. 伏地杜鹃属*——*Chiogenes* Salisb.

Salisb. in Trans. Hort. Soc. Lond. 2: 94. 1814; Ohwi, Fl. Jap.

1043. 1978; T. Z. Hsu in Act. Bot. Yunn. 6: 39—42. 1984.

匍匐,常绿,分枝小灌木。叶小,互生,在枝上成二排。花单一,腋生,具下弯的短梗;萼管不贴生子房,或因萼管与子房部分贴生而子房半下位,小苞片2,着生于花梗上部;花萼4裂;花冠短钟形,常白色,有时玫瑰红色,4浅裂,裂片圆形;雄蕊8,内藏,花丝短,长圆形,微粗糙,无毛,花药无芒,也不延长成管;子房上位或半下位,4室,花柱短;花盘8裂。浆果球形至椭圆形,白色或红色;种子多数。

本属模式种:硬毛伏地杜鹃 *Chiogenes hispidula* (Linn.) Torr. et Gray

3种1变种,间断分布于北美、日本和我国西南部。我国产1种1变种。

1. 伏地杜鹃(云南植物研究) 伏地杜(中国高等植物图鉴) 图版20: 1—7

Chiogenes suborbicularis (W. W. Smith) Ching ex T. Z. Hsu in Act. Bot. Yunn. 6: 40. 1984. — *Gaultheria suborbicularis* W. W. Smith in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 8: 186. 1914 et l. c. 14: 127, 212, 362. 1924; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 793. 1936; Airy Shaw in Kew Bull. 1940: 329. 1941; 中国高等植物图鉴 3: 188. 图 4330. 1974.

1a. 伏地杜鹃(原变种)

var. *suborbicularis*


常绿伏地小灌木,分枝多;幼枝被淡黄色硬毛。叶互生,近革质,宽卵形或近圆形,长约6毫米,宽约5毫米,先端和基部均钝圆,边缘疏生短硬毛,老则毛脱落,表面绿色,无毛,背面苍白,疏生硬毛,中脉在表面凹陷,在背面凸起,侧脉在两面不明显;叶柄长约1毫米。花小,单一,腋生;花梗长约1毫米,无毛;小苞片2,对生,卵形,长约2.5毫米,紫色,无毛,先端微尖;花萼长2毫米,裂片长圆形,无毛;花冠钟形,玫瑰红色,长约3毫米,至中部以上圆裂,两面无毛,先端反折;雄蕊内藏,花丝无毛,花药短,管状,无芒;子房上位,无毛,花柱粗短,长约1毫米,无毛。浆果球形,红色;花托在果时膨大,肉质;种子肾形,极小,黄褐色,有光泽。花期5—6月,果期7—10月。

产云南西北部。生于海拔3000—3800米的高山灌丛草地。模式标本采自云南西北部(无具体地点)。

1b. 白花伏地杜鹃(云南植物研究)(变种)

var. *albiflorus* T. Z. Hsu in Act. Bot. Yunn. 6: 41. 1984.

* 伏地杜鹃属(云南植物研究),伏地杜属(中国高等植物图鉴)。



伏地杜鹃 *Chiogenes suborbicularis* (W. W. Smith) Ching ex T. Z. Hsu: 1. 植株, 2. 叶表面, 3. 叶背面, 4. 花, 5. 雄蕊, 6. 雌蕊, 7. 果。(杨建昆绘)