

毛,疏被长圆状披针形宿存的叶芽鳞,老枝毛渐少。叶5—6片假轮生,叶片坚纸质,长圆状披针形至披针形,长3.5—5厘米,宽0.9—1.4厘米,顶端渐尖,基部渐狭,略钝,边缘有疏浅钝齿,两面无毛,中脉在两面突起,侧脉纤细,7—11对,连同网脉在叶面微突起,在背面不显;叶柄长约2毫米。花序生枝顶叶腋,总状或伞房状总状,长1.5—2厘米;序轴密被微柔毛,基部被多数覆瓦状排列的花芽鳞,芽鳞卵形,长3—5毫米,边缘有小流苏;苞片未见,小苞片2,生花梗基部,披针形,长约2毫米,无毛;花梗长5—7毫米,无毛,向上增粗,与萼筒间明显有关节;萼筒部无毛,萼齿三角形,长约1毫米,无毛,有1条中脉;花冠黄绿色,坛状,长约4毫米,外面不被毛,内面有短柔毛,口部5裂,裂齿短小;雄蕊10,较花冠短,花丝长约1毫米,无毛,基部扁平扩大,药室长1—1.2毫米,背部无距,药管与药室近等长;花柱不超出花冠。果未见。花期4月。

产我国西藏(墨脱)。生于海拔2300—2400米的常绿阔叶林中,附生树上。分布印度(东北部)、缅甸(北部)。我国分布新记录。

53b. 秃冠小轮叶越桔(亚种)

subsp. **glabritubum** P. F. Stevens in Journ. Arn. Arb. **66**: 487. 1985. — *V. vacciniaceum* (Roxb.) Sleumer var. *vacciniaceum* Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 479. 1941. p. p. — *V. serratum* auct. non (Don) Wight: Biswas, Pl. Darj. Sikkim Himal. **1**: 498. 1966.

与原亚种不同在于花冠内面无毛;叶柄长1—2毫米;叶片基部狭圆形。

产我国西藏(错那)。分布尼泊尔、锡金、不丹、印度东北部。

未见到西藏境内标本,以上系据 P. F. Stevens。

54. 白果越桔(西藏植物志)

Vaccinium leucobotrys (Nutt.) Nicholson in Ill. Dict. Gardn. **4**: 130. fig. 146. 1886; Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 478. 1941 descr. latina; P. F. Stevens in Journ. Arn. Arb. **66**: 483. 1985; 西藏植物志 **3**: 729. 1986. — *Epigynium leucobotrys* Nutt. in Curtis's Bot. Mag. **15**: t. 5103. 1859. — *Vaccinium serratum* (Don) Wight var. *leucobotrys* (Nutt.) C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 452. 1882. — *V. venosum* Wight var. *hispidum* auct. non C. B. Clarke: W. E. Evans in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 208. 1927.

常绿灌木,通常附生,高0.5—1米;有膨大的块根;幼枝褐色,具棱,密被微柔毛和褐色疏柔毛状刚毛,并覆有宿存的披针形叶芽鳞,老枝灰色,渐无毛,茎皮粗糙。叶4—5(—6)枚假轮生,叶片纸质,长圆形或长圆状卵形,长3—5(—7)厘米,宽1.8—3厘米,顶端短渐尖或锐尖,基部钝圆至微心形,边缘有细锯齿,两面无毛,干时草绿色,背面色较淡,侧脉多数,至边缘网结,与中脉在表面轻微下陷,在背面突起,网脉在表面明显,在背面不显;叶柄近无或仅有极短的柄。总状花序1—5枝生枝顶叶腋,花期长2—3厘米,果期近