

厘米,与花梗均被微柔毛;苞片三角形,长约1毫米,小苞片卵形,紧贴果基部;花未详,残存于果上的花冠长约2毫米,裂片较管长,椭圆状长圆形,边缘细波状,具脉状腺条纹,无毛;雄蕊着生于花冠管上,极小,退化,长略超过花冠管。果卵圆形,直径约5毫米,具脉状腺条纹,宿存萼包果顶端,萼片广三角形,基部耳形,具缘毛及脉状腺条纹。果期8—9月。

产西藏(墨脱),海拔1700—2050米的山坡阔叶林下。模式标本采于西藏墨脱。

本种与灰叶杜茎山(*M. chisia* D. Don)极相近,但叶片披针形或狭披针形,顶端尾状渐尖,长10—18厘米,宽1.7—4厘米,叶面脉下凹,可与区别。

16. 灰叶杜茎山(云南植物志) 图版3:1—3

乔极(云南景颇族语译音)

Maesa chisia D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 148. 1825; C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 509. 1882, excl. syn. *M. montana* A. DC.; Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236): 40. fig. 4. 1902; 云南植物志, 1: 323. 图版76, 图1—3. 1977——*M. montana* auct. non A. DC.: Walker, “静生汇报”, 9: 143. 1939 et in Philipp. Journ. Sci. 73: 29. 1940, quoad specim. H. T. Tsai 56764.

灌木,高1—2米;小枝有时具棱,幼时被疏细微柔毛,以后无毛。叶片坚纸质,长圆形、椭圆状披针形至倒披针形,顶端急尖或突然渐尖,基部楔形,长8.5—14厘米,宽2.5—5.5厘米,边缘具锯齿,两面无毛,中、侧脉明显,隆起,以背面尤甚,侧脉约10对;尾端分枝,直达齿尖,密生细脉状腺条纹;叶柄长约1.5厘米。圆锥花序,腋生,花未详;果序着生于二年生枝叶痕上,长1.5—4厘米,分枝多,无毛;苞片披针形,长约0.5毫米;果梗长1—2毫米,无毛;小苞片卵形,无毛;宿存萼片卵状三角形,无毛,边缘多少具疏缘毛,顶端具腺点。果球形,直径3—4毫米,略肉质,无毛,无腺点。花期未详,果期约12月。

产云南(西部),海拔约1880米的山坡疏林下,灌木丛中阳处。尼泊尔,不丹,印度,缅甸亦有。

本种主要特征是叶缘具锯齿,叶脉两面隆起,具密细脉状腺条纹,果序着生于二年生枝条叶痕上。

17. 小叶杜茎山(海南植物志)

Maesa parvifolia A. DC. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 8: 353. 1910; Pitard in Lecte., Fl. Gen. Indo-Chine 3: 775. 1930; Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 28. 1940; 海南植物志, 3: 165. 1974; 云南植物志, 1: 324. 图版76, 图4. 1977.

17a. 小叶杜茎山(原变种) 图版3:4

小种茶(海南)。

var. *parvifolia*

灌木或攀援灌木,分枝多,披散,高0.5—3米;小枝纤细,有时成“之”字形,被微柔毛

