

花瓣等长或超过,无毛;胚珠多数,多轮。果球形,直径约4毫米,紫红色,具小腺点,有时具纵肋。花期3—5月,果期10—12月。

产广西、云南,海拔600—1800米的山谷,山坡林中或林缘,荫湿的地方。印度,尼泊尔,缅甸等地亦有。

广西用嫩叶作茶。

本种与滇紫金牛(*A. yunnanensis* Mez)极相似,但花瓣粉红色或紫红色,具腺点;萼片卵形至椭圆状卵形;果具小腺点和纵肋;花序为复亚伞形花序组成的圆锥花序等,可与之区别。

13. 滇紫金牛(云南植物志) 图版5:10—11

Ardisia yunnanensis Mez in Engl., *Pflanzenreich* 9(IV. 236): 107. 1902; Pitard in *Lect. Fl. Gen. Indo-Chine* 3: 825. 1930; Walker, “静生汇报”, 9: 154. 1939 et in *Philipp. Journ. Sci.* 73: 64. 1940, p. p., in *Journ. Arn Arb.* 23: 348. 1942; 中国高等植物图鉴, 3: 216. 图4385. 1974; 云南植物志, 1: 338. 图版78, 图10—11. 1977.

乔木,高7—12米;嫩枝、花序、花梗及叶柄多少被锈色微柔毛或鳞片。叶片坚纸质,长圆状披针形至倒披针形,顶端渐尖,基部楔形,长12—22厘米,宽3—4.5厘米,全缘,两面无毛,腺点不明显,背面具极小的锈色鳞片,中脉明显,隆起,侧脉多于20对,平展,与中脉几成直角,近尾部向上弯,连成不明显的边缘脉;叶柄长约1.5厘米。由复亚伞形花序或聚伞花序组成圆锥花序,顶生或腋生,长5—9厘米;花梗长约5毫米,花长约3毫米,花萼基部连合达1/3,萼片三角状卵形至近披针形,长1(—1.5)毫米,里面具短柔毛,具缘毛,无腺点;花瓣白色,卵形,急尖,两面无毛,无腺点;雄蕊与花瓣近等长,花药卵形,顶端钝或急尖、渐尖,背部无腺点或腺点不明显;雌蕊与花瓣等长或略长,子房卵珠形,无毛;胚珠多数,数轮。果球形,直径约7毫米,紫红色,纵肋不明显,腺点不明显。花期4—5月,果期10—12月。

产贵州、云南、广西,海拔700—2400米山谷、山坡疏、密林中,坡边或荫湿处。印度,越南均有。模式标本采于云南思茅。

14. 细柄罗伞(云南植物志) 图版8:3—4

Ardisia tenera Mez in Engl., *Pflanzenreich* 9(IV. 236): 104. 1902; Walker, “静生汇报”, 9: 155. 1939 et in *Philipp. Journ. Sci.* 73: 80. 1940; 云南植物志, 1: 343. 图版80. 图3—4. 1977—*A. mexicana* Lévl. in *Fedde, Repert. Sp. Nov.* 10: 374. 1912.

小灌木或小乔木,高3—5米;小枝细,幼时被褐色鳞片或微柔毛(Mez在检索表中列为无毛),以后无毛。叶片坚纸质,椭圆状披针形或稀狭椭圆状卵形或倒卵形,顶端急尖或渐尖,基部楔形,长10—14(—18)厘米,宽2—4厘米,全缘,两面无毛,背面密被锈色鳞

