

1.5 毫米,三角状披针形,顶端急尖,具腺状缘毛。 花期约 5 月,幼果于 7 月。

产广西、广东(仅海南岛),密林下荫蔽的地方。越南北部亦有。模式标本采于海南岛陵水。

18c. 长萼罗伞树(海南植物志)(变种)

var. *oblonga* Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 77. fig. 12, e. 1940 et in Journ. Arn. Arb. 23: 346. 1942; 海南植物志, 3: 171. 1974.

本变种与前者主要区别是,花序长 1—1.5 厘米,被锈色微柔毛或鳞片,花粉红色,萼片长圆状披针形,顶端钝或圆形,长 1.5—3 毫米,被疏鳞片,具流苏状缘毛。 花期约 5 月,果期 11—12 月。

产广东(仅海南岛),山间密林下荫湿的地方。越南亦有。模式标本采于海南岛儋县。

19. 灰色紫金牛

细罗伞(广西)

Ardisia fordii Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 64. 1889; Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 81. 1940——*Embelia fordii* Mez in Engl. Pflanzenreich 9(IV. 236): 236. 1902.

小灌木,高 30—60 厘米,具匍匐状根茎;幼时茎密被锈色鳞片及微柔毛,通常除具侧生特殊花枝外,无分枝。叶片坚纸质,椭圆状披针形或倒披针形,顶端渐尖或钝,基部楔形且钝或近圆形,长 2.4—5.5 厘米,宽 1—1.6 厘米,全缘,两面无毛,背面被锈色鳞片,中脉于叶面下凹,背面明显隆起,侧脉极多,连成近边缘的边缘脉;叶柄长约 3 毫米。伞形花序,少花,着生于侧生特殊花枝顶端,花枝长 6—9 厘米,全部具叶或中部以上具叶;花梗长约 7 毫米,常于近基部具苞片 2;花长约 4 毫米,花萼仅基部连合,长约 1.5 毫米,萼片卵形,顶端急尖或近圆形,具腺点和缘毛,多少被小鳞片;花瓣红色或粉红色,广卵形,顶端急尖,具腺点,无毛,长约 4 毫米;雄蕊为花瓣长的 3/4,花药卵形,顶端急尖,背部无腺点;雌蕊较花瓣略短,子房球形,无毛,具腺点;胚珠 5 枚,1 轮。果球形,直径约 5 毫米,有的达 8—9 毫米,深红色,具疏鳞片,具腺点。 花期 6—7(—8)月,果期 10—12 月,有时达 2 月。有的植株有上部枝开花,下部枝结果的情况。

产广东(海南岛不产)、广西,海拔 100—800 米的疏、密林下荫湿的地方,或水边溪旁。模式标本采于广东,具体地点不详。

20. 柳叶紫金牛(云南植物志) 图版 7: 6—7

Ardisia hypargyrea C. Y. Wu et C. Chen, 云南植物志, 1: 340. 图版 79, 图

图版 7: 1—3. 星毛紫金牛 *Ardisia stellata* Walker, 1. 叶, 2. 幼果, 3. 花萼上的星状毛; 4—5. 折梗紫金牛 *A. curvula* C. Y. Wu et C. Chen, 4. 花枝, 5. 幼果; 6—7. 柳叶紫金牛 *A. hypargyrea* C. Y. Wu et C. Chen, 6. 果枝, 7. 果; 8—9. 剑叶紫金牛 *A. ensifolia* Walker, 8. 叶, 9. 果; 10—12. 圆果罗伞 *A. depressa* C. B. Clarke, 10. 叶, 11. 花冠(一部分)展开, 12. 花除花冠。(肖溶绘)