

6—7. 1977——*A. salicifolia* Walker, “静生汇报”, 9:156. 图 18. 1939 et in Philipp. Journ. Sci. 73:72. fig. 11. 1940, non A. DC. (1844).

灌木, 高约 1 米; 嫩枝被鳞片, 无毛, 具小皮孔及叶痕。叶片坚纸质或略厚, 狭披针形, 顶端长渐尖, 基部楔形, 长 6—8 厘米, 宽约 1.2 厘米, 全缘, 边缘外卷, 两面无毛, 背面多少具锈色鳞片, 侧脉多数, 密且细, 不明显; 叶柄长约 5 毫米。亚伞形花序或聚伞花序, 腋生或近顶生, 着生于多少伸长的侧生特殊花枝顶端, 花枝长 4—13 厘米, 常于中部以上有叶; 总梗及花梗细, 长约 1 厘米或较短, 被微柔毛或鳞片; 花长约 3 毫米, 花萼仅基部连合, 萼片三角状卵形或近三角形, 顶端急尖, 长不及 1 毫米, 具缘毛, 有或极少的腺点, 外面无毛, 具鳞片; 花瓣粉红色或紫红色, 卵形, 顶端急尖, 腺点不明显, 无毛; 雄蕊达花瓣长的 3/4, 花药卵形, 背部无腺点; 雌蕊与花瓣等长或超过, 子房球形, 无毛。果球形, 直径约 4 毫米, 红色, 腺点与纵肋不明显。 花期约 5 月, 果期 11—12 月。

产云南东南部和广西(龙胜), 海拔 700—1550 米山谷、山坡疏、密林下, 荫处和水边。模式标本采于云南蒙自。

21. 剑叶紫金牛(云南植物志) 图版 7:8—9

开喉箭(广西)

Ardisia ensifolia Walker in Philipp. Journ. Sci. 73:124. 1940; 云南植物志, 1:340. 图版 78, 图 8—9. 1977.

小灌木, 高约 30 厘米, 根茎伸长, 木质; 直立茎老时灰褐色具纵纹, 有明显的叶痕, 除侧生特殊花枝外不分枝。叶片坚纸质或革质, 狭披针形至线形, 顶端狭渐尖, 基部楔形, 长 7—12(—20) 厘米, 宽约 1(—2.5) 厘米, 全缘, 边缘反卷及具边缘腺点, 两面无毛, 中脉于背面明显隆起, 侧脉极不明显, 连成不明显的边缘脉; 叶柄长 3—8 毫米。亚伞形花序, 着生于顶端弯曲的侧生特殊花枝顶端, 花枝长 2—7 厘米, 无叶, 被细微柔毛; 花梗长 1(—2) 厘米, 具疏鳞片或细微柔毛; 花长约 6 毫米, 花萼基部连合, 萼片广卵形, 长 2—3(—4) 毫米, 顶端钝或圆形, 具密腺点, 无毛; 花瓣红色, 长圆状卵形, 长 5—6 毫米, 具密腺点; 雄蕊与花瓣几等长, 花药长圆状披针形, 背部多少有腺点; 雌蕊与花瓣等长或略长, 子房卵珠形, 无毛; 胚珠约 6 枚, 1 轮。果球形, 直径约 6 毫米, 红色, 具腺点。 花期 5—7 月, 果期 11 月至翌年 1 月, 少有至 4 月。

产云南、广西, 海拔约 700 米的密林下, 荫湿处或石缝间。模式标本采于广西凌云。

有用其根与其他草药配伍治鹅喉。

22. 凹脉紫金牛

山脑根(广东), 棕紫金牛、石狮子(广西)

Ardisia brunnescens Walker in Journ. Washington Acad. Sci. 27:198. fig. 1. 1937 et in Philipp. Journ. Sci. 73:68. fig. 9. 1940.

灌木, 高 0.5—1 米; 小枝灰褐色, 略肉质, 具皱纹。叶片坚纸质, 椭圆状卵形或椭圆

