

形,顶端急尖或广渐尖,基部楔形,长8—14厘米,宽3.5—6厘米,全缘,两面无毛,叶面侧脉常下凹,背面中、侧脉明显,隆起,侧脉10—15对,常连成断续的边缘脉或一圈波状脉;叶柄长7—12毫米。复伞形花序或圆锥状聚伞花序,着生于侧生特殊花枝顶端,花枝长5—9厘米,无毛,近顶端有1—2片多少退化的叶;花梗长约1厘米,微弯;花长约4毫米,花萼基部连合达1/3,萼片广卵形,顶端钝,长约1.5毫米,具腺点和极细的缘毛,有时被疏锈色鳞片;花瓣粉红色,仅基部连合,卵形,顶端急尖,具多或少的腺点,长约4毫米,外面无毛,里面近基部具细乳头状突起;雄蕊较花瓣略短,达花瓣长的2/3,花药卵形,顶端点尖,背部具腺点或无;雌蕊与花瓣等长,子房卵珠形,无毛。果球形,直径6—7毫米,深红色,多少具不明显的腺点。 花期末详,果期10至翌年元月。

产广西、广东(海南岛不产),见于山谷疏、密林下或灌木丛中,或石灰岩山坡的林下。模式标本采于广西龙州。

根药用,妇女产后燉猪肉吃,可增强体质。

23. 细孔紫金牛(海南植物志)

Ardisia porifera Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 70. fig. 10. 1940; 海南植物志, 3: 170. 1974.

亚灌木或小灌木,高20—30厘米,具匍匐茎;直立茎无毛,除侧生特殊花枝外不分枝。叶片革质,椭圆状倒卵形至倒卵形,顶端广急尖或近圆形,基部楔形,长8—13厘米,宽3—5.5厘米,全缘,边缘反卷,两面无毛,无腺点,具极多且小的窝点,中脉于叶面微微隆起,背面明显,隆起,侧脉约8对,两面微隆起,不连成边缘脉或边缘脉不明显;叶柄长5—15毫米。总状花序或亚伞形花序,着生于侧生特殊花枝顶端,花枝长3—7.5厘米,无毛,近顶端具1—2片退化叶;总梗长7—15毫米,花梗长约1厘米,均无毛;花未详。幼果萼片卵形,顶端急尖,长约1.5毫米,被微柔毛及缘毛,具腺点(原描述无腺点),子房被微柔毛。果球形,直径约5毫米,紫色或黑色,具纵肋,无腺点。 花期末详,幼果期7月。

产广东(仅海南岛——乐东),密林下。

组5. 圆齿组 Sect. *Crispardisia* Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236): 141. 1902; Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 82. 1940.

直立灌木或小灌木,常具匍匐茎;叶缘具各式圆齿或锯齿,齿间或齿尖具边缘腺点;亚伞形或亚聚伞花序,或复伞形或复聚伞花序,着生于侧生特殊花枝顶端,稀侧生或腋生;萼片卵形、披针形或狭披针形,顶端急尖或渐尖,稀钝,果时大多数反卷,不贴果;花瓣基部微连合,将开的花蕾花柱伸出或不伸出;胚珠5枚,稀略多,1轮。

24. 显脉紫金牛(云南植物志) 图版10:5—8

Ardisia alutacea C. Y. Wu et C. Chen, 云南植物志, 1: 346. 图版81, 图5—8. 1977.