

灌木,高40—100厘米,除侧生特殊花枝外,无分枝,无毛或几无毛。叶片革质,椭圆形、倒卵形或披针形,顶端急尖,基部楔形,长8—12.5厘米,宽3—4.5厘米,边缘具浅圆齿,齿间具极不明显的边缘腺点,两面无毛,叶脉两面明显,隆起,以背面尤甚,侧脉7—9对,连成近边缘的边缘脉,于中部再次连结,侧脉间具数条平行小脉,网脉明显,隆起,无腺点;叶柄长约1厘米。复聚伞花序,着生于侧生特殊花枝顶端,第二次分枝时,常呈二歧式聚伞花序,花枝长5—11厘米,第二次聚伞花序总梗长1—2厘米,无毛;花梗长1.5—2厘米,近萼处稍膨大,具腺点;花长约9毫米,花萼基部微微连合,长约1.5毫米,萼片广卵形,顶端钝,全缘,密布腺点;花瓣紫红色,三角状卵形,长约9毫米,顶端渐尖,两面无毛,密布腺点;雄蕊较花瓣短,花丝极短或几无,花药与花瓣同形,但较小,披针形,背腹部均具腺点,尤以背部为密;雌蕊与雄蕊等长,无毛,子房球形,花柱具腺点;胚珠6枚,1轮。果球形,直径约8毫米,紫红色,略具腺点,宿存萼片紧包果基部。 花果期5—6月,或果期12月,通常是同一植株上,花与果都有。

产云南东南部,海拔800—1700米的山谷,杂木林下荫蔽湿润的地方。模式标本采于云南马关。

本种与白花紫金牛(*A. meullii* Walker)很相近,但本种花被腺点极多,叶厚,除边缘脉外,侧脉再次连结,可以区别。

25. 粗脉紫金牛(海南植物志)

小罗伞树(海南岛)

Ardisia crassinervosa Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 86. fig. 14. 1940; 海南植物志, 3: 172. 1974.

灌木,高0.5—1(—2)米;小枝具皱纹,无毛,除侧生特殊花枝外,无分枝。叶片革质,长圆状倒披针形,顶端急尖或钝,基部楔形,长4.5—8厘米,宽1.2—1.5(—3)厘米,边缘具圆齿或几全缘,齿间具明显的边缘腺点,两面无毛,背面具腺点或无,中、侧脉明显,隆起,侧脉12—18对,连成明显的边缘脉;叶柄长3(—5)毫米。亚伞形花序或聚伞花序,多花,着生于侧生特殊花枝顶端,花枝长5—10(—16)厘米,无毛,中部以上具4—5片叶,或近顶端具1—2片叶,叶有时多少退化;花梗长约1厘米,无毛,花长约4毫米,花萼仅基部连合,萼片广卵形或近圆形,顶端极钝或近圆形,基部略具耳形,互相折叠,长约2.5毫米,全缘,边缘干膜质,具腺点,有时腺点不明显;花瓣粉红色至淡紫色,长约4毫米,广卵形,顶端钝或近圆形,具极明显的腺点,外面无毛,里面具极少的微柔毛;雄蕊为花瓣长的 $\frac{2}{3}$ 或近等长,花药披针形,顶端急尖,背部具腺点;雌蕊与花瓣等长,子房圆珠形,无毛,具腺点;胚珠5枚,1轮。果球形,直径约4毫米,红色,具明显的腺点。 花期与果期常同在1—3月或7—12月。

产广东(仅海南岛),海拔100—1800米的山坡、草坡灌木丛中,或坡地疏林或密林下阳处。模式标本采于海南岛临高与澄迈之间。