

26. 多脉紫金牛(海南植物志)

Ardisia nervosa Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 88. 1940; 海南植物志, 3: 171. 1974.

灌木, 高约 2 米或更高, 除侧生特殊花枝外, 无分枝, 无毛。叶片坚纸质或略厚, 椭圆状披针形或倒披针形, 罕倒卵形, 顶端急尖或渐尖, 基部楔形, 长 10—17 厘米, 宽 3—6 厘米, 边缘通常于上半部具浅波状齿, 具边缘腺点, 两面无毛, 中脉两面隆起, 侧脉 20 对或略多, 明显, 隆起, 连成边缘脉, 细脉网状, 隆起; 叶柄长 7—15 毫米。单或复伞形花序, 着生于侧生特殊花枝顶端, 花枝长 8—20 厘米, 无毛, 于上半部或仅花序下面具 2—3 片叶; 花梗长约 1 厘米, 被微柔毛, 具腺点; 花长 5—6 毫米, 花萼仅基部连合, 长约 4 毫米, 萼片长圆状卵形, 顶端圆形或钝, 无毛, 具密腺点; 花瓣粉红色、浅紫色或白色(原描述), 长卵形, 顶端钝, 长 5—6 毫米, 具密腺点, 里面密被乳头状突起, 外面无毛; 雄蕊较花瓣略短, 花药披针形, 顶端细尖, 背部无腺点或具少数腺点; 雌蕊与花瓣等长, 子房球形, 具腺点; 胚珠 9 枚, 1 轮。果球形, 直径约 9 毫米, 红色, 具密腺点。花期 5—7 月, 果期 11 月至翌年 1 月。

产广东(仅海南岛), 海拔约 400 米以下的山坡、山谷密林下, 潮湿的地方或水旁。模式标本采于海南岛崖县。

皮供药用, 治腹痛、便血。

27. 纽子果(云南)

扣子果、米汤果(云南), 大罗伞(广西), 绿叶紫金牛(中国高等植物图鉴), 圆齿紫金牛(海南植物志), 黑星紫金牛(台湾)。

Ardisia virens Kurz, For. Fl. Brit. Burma 2: 575. 1877; C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 524. 1882; Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236): 147. 1902; Walker, “静生汇报”, 9: 157. 1939, in Philipp. Journ. Sci. 73: 82. 1940, in Journ. Arn. Arb. 23: 353. 1942, excl. syn. *A. virens* var. *annamensis* Pitard et in Quart. Journ. Taiwan Mus. 12: 180. 1959; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 170. 1963; 中国高等植物图鉴, 3: 218. 图 4389. 1974; 海南植物志, 3: 171. 1974; 云南植物志, 1: 343. 图版 80, 图 5. 1977——*Tinus virens* O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 975. 1891——*A. radians* Hemsl. et Mez ex Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236): 146. 1902——*A. oldhamii* Mez, l. c. 148——*A. rectangularis* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30(1): 182. 1911——*Bladhia radians*, Masam., Short Pl. Form. 162. 1936——*B. oldhamii* Masam., l. c.

27a. 纽子果 图版 8:5

var. *virens* (原变种)

灌木, 高 1—3 米; 茎粗壮, 除侧生特殊花枝外, 无分枝, 无毛。叶片坚纸质或厚, 椭圆状