

形,无毛;胚珠5枚,1轮。果未详,花期5—6月。

产广西(龙州),见于密林下。越南(北部)亦有。

29. 珍珠伞(云南)

山豆根、紫绿果(根)、紫背绿(云南)

Ardisia maculosa Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236):146. 1902; Pitard in Lecte., Fl. Gen. Indo-Chine 3:874. 1930; Walker, “静生汇报”, 9:165. 1939 et in Philipp. Journ. Sci. 73:122. 1940, p. p. maj., excl. spcim. H. T. Tsai 51926, 55256, 60138, 60264, C. W. Wang 75227, 76603, 78134, H. Y. Liang 69756; 云南植物志, 1:344. 图版 80, 图 6—8. 1977——*A. patens* Mez, l. c. 149——*A. virens* auct. non Kurz: Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39:419. 1911.

29a. 珍珠伞(原变种) 图版 8:6—8

var. **maculosa**

灌木,高1—2米,稀达6米;除侧生特殊花枝外,无分枝,无毛。叶片坚纸质,椭圆形或长圆状披针形,稀倒披针形,顶端渐尖或近尾状渐尖,基部楔形或略下延,长10—18厘米,宽3—6厘米,几全缘或具浅圆齿,具边缘腺点,两面无毛,背面有时被疏鳞片,侧脉约15对,边缘脉不明显;叶柄长1(—1.5)厘米。复亚伞形聚伞花序,着生于侧生特殊花枝顶端,花枝全部有叶,稀中部以下无叶,长30—40厘米,被微柔毛或几无毛;花梗长1—2厘米,被微柔毛或几无毛;花长5—6毫米,花萼仅基部连合,长1.5—2.5毫米,萼片卵形或长圆状卵形,稀长圆形,顶端急尖或近圆形,两面无毛,全缘,具疏腺点;花瓣粉红色,卵形,顶端急尖,无腺点或腺点极不明显,两面无毛或仅里面近基部被细微柔毛;雄蕊比花瓣略短,花药披针形,背部无腺点;雌蕊与花瓣近等长,子房卵珠形,无毛;胚珠5枚,1轮。果球形,直径7—9毫米,红色或带黑色,无腺点或腺点不明显。花期5—6月,果期12月至翌年3月。

产云南(东南部及思茅等地),海拔1200—1600(—1900)米的沟谷林下潮湿的地方。越南亦有。模式标本采于云南思茅。

全株治骨折、跌打、白喉、咽喉肿痛、胃溃疡、急性肠炎等症。

29b. 黄叶珍珠伞(变种) 图版 9:4—7

var. **symplocifolia** C. Chen, 植物分类学报 16(3):79. 图1, 4—7, 1978——*A. maculosa* auct. non Mez: Walker, “静生汇报”, 9:165. 1939 et in Philipp. Journ. Sci. 73:122. 1940, quoad spcim. H. T. Tsai 55256, 60138, 60264, C. W. Wang 75227, 76603, 78134.

图版 9: 1—3. 密腺杜茎山 *Maesa prodigiosa* C. Chen, 1. 花枝, 2. 叶片背面放大, 示脉状腺条纹, 3. 花(放大); 4—7. 黄叶珍珠伞 *Ardisia maculosa* var. *symplocifolia* C. Chen, 4. 花枝, 5. 花萼展开(放大), 6. 花冠展开(放大), 7. 雄蕊背部(放大); 8—9. 墨绿酸藤子 *Embelia nigroviridis* C. Chen, 8. 果枝, 9. 叶片背面放大。(曾孝濂绘)