

本变种与前者主要区别是,叶片较厚,坚纸质至近革质;萼片、花瓣里面被微柔毛,总花梗较长,长2—11厘米,有时更长。

产云南(南部和东南部),海拔300—1600米的山谷林下,湿润的地方。模式标本采于云南河口。

30. 郎伞木(海南岛)

高脚鸡眼、小罗伞(广东),大罗伞、胭脂木、雀儿肾(广西),美丽紫金牛(中国高等植物图鉴)

Ardisia elegans Andr., Bot. Repos. 10, pl. 623. 1810; Rehder in Journ. Arn. Arb. 15: 290. 1934; Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 110. 1940, excl. syn. *A. konishii* Hayata; 中国高等植物图鉴, 3: 223. 图 4399. 1974; 海南植物志, 3: 172. 图 647. 1974——*A. crispa* var. *elegans* A. DC. in DC., Prodr. 8: 134. 1844——*A. elegantissima* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 10: 373. 1912——*Bladhia elegans* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo 39: 308. 1925——*A. roseiflora* Pterid in Lecte., Fl. Gen. Indo-Chine 3: 866. 1930; Walker, l. c. 101, syn. nov.——*A. konishii* auct. non Hayata: Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 143. 1927.

灌木,高1—3米;茎粗壮,无毛,除侧生特殊花枝外,无分枝。叶片坚纸质,略厚,椭圆状披针形、倒披针形或稀狭卵形,顶端急尖或渐尖,基部楔形,长9—12(—15)厘米,宽2.5—4厘米,边缘通常具明显的圆齿,齿间具边缘腺点,或呈皱波状,或近全缘(海南岛多数标本),两面无毛,无腺点,叶面中脉微凹,背面中脉隆起,有时具细微的小窝点及近边缘具疏且不明显的腺点,侧脉12—15对,连成不甚明显的边缘脉;叶柄长0.8—1.5厘米,具沟和狭翅。复伞形花序或由伞房花序组成的圆锥花序,着生于侧生特殊花枝顶端,花枝长30—50厘米,顶端常下弯,无毛,全部散生叶,稀仅中部以上具叶,小花序梗长2—4厘米,无毛;花梗长1—2厘米,无毛,罕被疏微柔毛;花长6—7毫米,稀5或8毫米,花萼仅基部连合,萼片卵形或长圆状卵形,顶端急尖或钝,长约2.5毫米,无腺点;花瓣粉红色,稀红色或白色,广卵形,仅基部连合,无腺点,两面无毛,稀里面基部被微柔毛;雄蕊比花瓣略短,花药披针形或卵形,顶端急尖,无腺点;雌蕊与花瓣等长,子房卵珠形,无毛;胚珠5枚,1轮。果球形,直径8—10(—12)毫米,深红色,具明显的腺点。花期6—7月,果期12月至翌年3—4月,个别达7月,有的植株上部枝条开花,下部枝条果熟。

产广东、广西,海拔达1300米的山谷、山坡疏、密林中,阳处、荫湿处或溪旁。越南亦有。

供药用,治腰骨疼痛、跌打等症;叶用于拔疮毒。

31. 伞形紫金牛

紫背禄(广西),不待劳(云南),毛高(云南傣语译音),西南紫金牛(中国高等植物图鉴)