

本种与山血丹(*A. punctata* Lindl.)相近,但叶较狭,边缘脉较近边缘,萼片卵形或广卵形;又与大罗伞树(*A. hanceana* Mez)更相似,但叶狭且小,边缘腺点不明显,侧生特殊花枝顶端叶较少,仅有1—2片,可以区别。

36. 山血丹(广东)

细罗伞树、小罗伞(广东),血党、活血胎(广西),郎伞(江西),沿海紫金牛(中国高等植物图鉴),铁雨伞(浙江)

Ardisia punctata Lindl., Bot. Reg. 10: pl. 827. 1824; Hance in Ann. Sci. Nat. v. Bot. 5: 225. 1866; Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236): 142. 1902; Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 102. fig. 18. 1940; 中国高等植物图鉴, 3: 221. 图 4395. 1974——*Tinus punctata* O. Ktze., Rev., Gen. Pl. 2: 972. 1891——*Bladhia punctata* Nakai in Bot. Mag. Tokyo 35: (99). 1921.

灌木或小灌木,高1—2米;茎幼时被细微柔毛,无皱纹,除侧生特殊花枝外,无分枝。叶片革质或近坚纸质,长圆形至椭圆状披针形,顶端急尖或渐尖,稀钝,基部楔形,长10—15厘米,宽2—3.5厘米,近全缘或具微波状齿,齿尖具边缘腺点,边缘反卷,叶面无毛,中、侧脉微隆起,背面被细微柔毛,脉隆起,除边缘外其余无腺点或腺点极疏,侧脉8—12对,连成远离边缘的边缘腺;叶柄长1—1.5厘米,被微柔毛。亚伞形花序,单生或稀为复伞形花序,着生于侧生特殊花枝顶端;花枝长3—11厘米,顶端下弯,且具少数退化叶或叶状苞片,被细微柔毛;花梗长8—12毫米,果时达2.5厘米;花长约5毫米,花萼仅基部连合,被微柔毛,萼片长圆状披针形或卵形,顶端急尖,长2—3毫米,具缘毛或几无毛,具腺点;花瓣白色,椭圆状卵形,顶端圆形,具明显的腺点,里面被微柔毛,外面无毛;雄蕊较花瓣略短,花药披针形,顶端具小尖头,背部具腺点;雌蕊与花瓣等长,子房卵珠形,被微柔毛,具腺点;胚珠5枚,1轮。果球形,直径约6毫米,深红色,微肉质,具疏腺点。花期5—7月,少数于4、8、11月,果期10—12月,有时有的植株上部枝条开花,下部枝条果熟。

产浙江、江西、福建、湖南、广东(海南岛不产)、广西,海拔270—1150米的山谷、山坡密林下,水旁和荫湿的地方。模式标本采于广东南部,具体地点不详。

根可调经、通经、活血、祛风、止痛,亦作洗药,可去无名肿毒。有的亦用于妇女不孕症。

37. 九管血(江西)

血猴爪、(真)猴爪、乌肉鸡、矮凉伞子(江西),小罗伞(两广),团叶八爪金龙(贵州、四川),血党(江西、广西、中国高等植物图鉴),山豆根(贵州、云南),活血胎

Ardisia brevicaulis Diels in Engl., Bot. Jahrb. 29: 519. 1900; Mez. in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236): 143. 1902; Walker in Journ. Arn. Arb 15: 289 1934, in Philipp. Journ. Sci. 73: 105. 1940 et in Quart. Journ. Taiwan Mus. 12: 176. fig. 8. 1959; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 711. 1963; 中国高等植物图鉴, 3: 221. 图 4396. 1974; 云南植物志, 1: 347. 图版 81, 图 9—10. 1977——*A. bodinieri* Lévl. in Fedde,