

形。浆果朱红色,直径7毫米,具干黑腺点。 果期约1月。

产我国台湾(南投)山间。

我们未见标本,上述特征按原描述译出。

本种与腺齿紫金牛 (*A. cornudentata* Mez) 极近似,主要区别是后者萼片近圆形或圆形,或广卵形。

40. 细罗伞(广东) 图版 11:3

波叶紫金牛(中国高等植物图鉴)

Ardisia affinis Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 63. 1889; Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236): 144. 1902; Walker. in Philipp. Journ. Sci. 73: 99. 1940, p. p. maj.; 中国高等植物图鉴, 3: 220. 图 4393. 1974——*Tinus affinis* O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 974. 1891.

小灌木,高达35厘米,有时具匍匐茎;幼嫩部分密被锈色微柔毛,以后渐疏,除侧生特殊花枝外,几无分枝。叶片坚纸质或较薄,椭圆状卵形至长圆状倒披针形,顶端钝或急尖,基部楔形,长1.5—3.5厘米,宽1—1.5厘米,边缘具浅波状齿或近圆齿,齿间具腺点或腺点不明显,具腺点,叶面仅微凹的中脉具腺状微柔毛,背面被腺状微柔毛,中脉隆起,侧脉4—5对,不连成边缘脉;叶柄长2—5毫米。伞形花序,着生于侧生特殊花枝顶端,下弯,花枝长2—4厘米,近顶端常有2—3片退化叶,被锈色微柔毛;花梗长约8毫米,被锈色微柔毛;花长约4毫米,花萼基部连合达全长的1/3或略短,长约1毫米,萼片卵形,顶端急尖或钝,仅于连合部分被微柔毛,具腺点,有时具缘毛;花瓣淡粉红色,仅基部连合,卵形,顶端急尖,长约4毫米,具疏腺点,外面无毛,里面略被微柔毛或无毛;雄蕊较花瓣略短,花药披针形,背部具腺点;雌蕊与花瓣近等长,子房卵珠形,具疏腺点,无毛;胚珠5枚,1轮。果球形,直径约7毫米,红色,略肉质,无腺点。 花期5—7月,果期10—12月或翌年1月。

产江西、湖南、广东、广西,海拔100—600米的石灰岩山林下,溪边、路旁的石缝荫湿处。模式标本采于广东,具体地点不详。

根供药用,可散瘀活血,用于跌打损伤,亦有助于治双、单蛾喉。

41. 狭叶紫金牛

喘咳木(广西)

Ardisia filiformis Walker in Journ. Washington Acad. Sci. 27: 198. fig. 2. 1937 et in Philipp. Journ. Sci. 73: 126. fig. 24. 1940.

灌木,高约1米,通常无分枝或少分枝,枝条无毛。叶片膜质,狭披针形或披针形,顶端狭渐尖,略镰形,稀长急尖,基部广楔形,长12—20(—23)厘米,宽1—2.5(—3.5)厘米,稀长达32厘米,宽1.5厘米,全缘或具极浅的疏波状齿,齿尖具极小的腺点,叶面无毛,中脉平整,背部多少被细鳞片,中脉隆起,具腺点,腺点两面隆起,侧脉10—15对,连成明显

的边缘脉;叶柄长约3毫米,稀达5或10毫米。圆锥花序,腋生,长4—7厘米,稀达12.5厘米或更长,无毛;花梗长8—15毫米,极细;花长3—4毫米,花萼仅基部连合,长约1毫米,萼片卵形,顶端钝或近圆形,无毛,具腺点;花瓣粉红色或淡红色,长圆状卵形,顶端略钝,具腺点,无毛;雄蕊较花瓣略短,花药披针形;雌蕊与花瓣等长,子房球形,腺点不明显,无毛。果球形,蓝黑色或红色,直径约6毫米,具腺点。花期4—5月,果期约12月。

产广西(南部),海拔200—980米的山间密林中,湿润的地方。模式标本采于广西南宁。

全株供药用,可镇咳平喘。

42. 百两金(本草纲目)

山豆根、地杨梅(植物名实图考、湖南),开喉箭(江西、湖南、四川、贵州),珍珠伞(江西、浙江、广东),矮茶(浙江、广东),白八爪(湖北),高脚凉伞(广西),八爪金龙(四川)

Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. in Trans. Linn. Soc. 17: 124. 1834; Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 118. fig. 21, a-d. 1940; 中国高等植物图鉴, 3: 222. 图 4398. 1974; 云南植物志, 1: 349. 1977——*Bladhia crispa* Thunb., Fl. Jap. 97. 1784——*A. hortorum* Maxim. ex Regel, Gartenflora 14: 363. pl. 491. 1865; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 756. 1936, excl. syn. *A. dielsii* Lévl., *A. henryi* var. *dielsii* Walker; 陈嵘, 中国树木分类学, 972. 图 861. 1937——*Tinus crispa* O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 405. 1891——*A. henryi* Hemsl. in Journ. Linn. Bot. 26: 65. 1889——*T. henryi* O. Ktze., l. c. 974——*A. penduliflora* Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236): 150. 1902.

42a. 百两金(原变种)

var. **crispa**

灌木,高60—100厘米,具匍匐生根的根茎,直立茎除侧生特殊花枝外,无分枝,花枝多,幼嫩时具细微柔毛或疏鳞片。叶片膜质或近坚纸质,椭圆状披针形或狭长圆状披针形,顶端长渐尖,稀急尖,基部楔形,长7—12(—15)厘米,宽1.5—3(—4)厘米,全缘或略波状,具明显的边缘腺点,两面无毛,背面多少具细鳞片,无腺点或具极疏的腺点,侧脉约8对,边缘脉不明显;叶柄长5—8毫米。亚伞形花序,着生于侧生特殊花枝顶端,花枝长5—10厘米,通常无叶,长13—18厘米者,则中部以上具叶或仅近顶端有2—3片叶;花梗长1—1.5厘米,被微柔毛;花长4—5毫米,花萼仅基部连合,萼片长圆状卵形或披针形,顶端急尖或狭圆形,长1.5毫米,多少具腺点,无毛;花瓣白色或粉红色,卵形,长4—5毫米,顶端急尖,外面无毛,里面多少被细微柔毛,具腺点;雄蕊较花瓣略短,花药狭长圆状披针形,背部无腺点或有;雌蕊与花瓣等长或略长,子房卵珠形,无毛;胚珠5枚,1轮。果球形,直径5—6毫米,鲜红色,具腺点。花期5—6月,果期10—12月,有时植株上部开花,下部果熟。