

产长江流域以南各省区(海南岛未发现),海拔100—2400米的山谷、山坡,疏、密林下或竹林下。日本,印度尼西亚亦有。

根、叶有清热利咽、舒筋活血等功效,用于治咽喉痛、扁桃腺炎、肾炎水肿及跌打风湿等症,又用于治白浊、骨结核、癆伤咳血、痢疗、蛇咬伤等。果可食;种子可榨油。

42b. **大叶百两金** (云南植物志) (变种)

八爪金、高八爪 (四川)

var. **amplifolia** Walker in Philipp. Journ. Sci. **73**: 121. fig. 22. 1940; 云南植物志, **1**: 349. 1977——*A. depressa* auct. non C. B. Clarke: Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**: 419. 1911.

本变种与前者主要区别是,植株粗壮,叶长且宽,长15—25厘米,宽4—5.8厘米,侧生特殊花枝通常无叶,稀有叶,长5—7厘米,稀达9厘米。

产四川、贵州、云南、广西、广东(海南岛未发现),海拔1000—2450米的密林下或苔藓林下,潮湿的地方。模式标本采于云南蒙自。

根治风湿跌打、喉症及健脑。

42c. **细柄百两金** (云南植物志) (变种)

山豆根 (云南)

var. **dielsii** (Lévl.) Walker in Journ. Washington Acad. Sci. **29**: 260. 1939 et in Philipp. Journ. Sci. **73**: 121. fig. 21, c. 1940; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 712. 1963; 云南植物志, **1**: 351. 1977——*A. dielsii* Lévl. in Fedde, Repert. sp. Nov. **9**: 461. 1915——*A. simplicicaulis* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **30**: 183. 1911——*A. henryi* var. *dielsii* Walker in Journ. Arn. Arb. **15**: 290. 1934——*A. hortorum* var. *brachysepala* Hand.-Mazz., Symb. sin. **7**: 756. 1936——*Bladhia crispa* var. *dielsii* Nakai in Bot. Mag. Tokyo **55**: 527. 1941.

本变种与前者主要区别是,植株较矮,高1米以下,叶长而狭,狭披针形,长12—21厘米,宽1—2(—3.5)厘米,侧脉极弯曲上升。

产四川、贵州、云南、广西、广东(海南岛未发现)、台湾,海拔900—2120米的山坡疏、密林下,荫湿的地方,有时亦出现于苔藓林下。日本亦有。模式标本采于贵州贵阳附近。

全株有止血消炎作用,用于治刀伤、喉痛等症。

43. **尾叶紫金牛** (云南植物志) 图版12: 1—2

峨嵋紫金牛 (中国高等植物图鉴)

Ardisia caudata Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 63. 1889; Mez in Engl.,

图版12: 1—2. **尾叶紫金牛** *Ardisia caudata* Hemsl., 1.花枝, 2.花; 3—4. **瑞丽紫金牛** *A. shweliensis* W. W. Smith, 3.果枝, 4.叶片放大示腺点; 5—9. **粗梗紫金牛** *A. crassipes* C. Y. Wu et C. Chen, 5.植株上部, 6.花冠(一部分)展开, 7.花除花冠, 8.雄蕊背部, 9.胎座。(肖溶绘)