

Pflanzenreich 9(IV. 236):148. 1902; Merr. et Chun in Sunyatsenia 2:14. 1934; Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 108. 1940; 中国高等植物图鉴, 3:222. 图 4398. 1974; 云南植物志, 1:348. 图版 82, 图 1—2. 1977——*Tinus caudata* O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2:974. 1891.

多枝灌木,高 0.5—1 米;枝条纤细,被微柔毛,以后无毛,除侧生特殊花枝外,无分枝或仅从基部分枝。叶片膜质,长圆状或椭圆状披针形,稀椭圆形,顶端长而细渐尖或尾状渐尖,基部楔形或钝,近圆形,长 6—13 厘米,宽 2—3(—4.5)厘米,边缘具皱波状浅圆齿或圆齿,具边缘腺点,两面无毛,背面被不甚明显的疏鳞片,无腺点,侧脉约 8 对,不连成边缘脉;叶柄长 5—8 毫米。复亚聚伞花序或伞形花序,着生于侧生特殊花枝顶端,被微柔毛;花枝长 5—20 厘米,近顶端具 3—4 片叶;花梗长 7—12 毫米,被微柔毛,花长 6(—8)毫米,花萼仅基部连合,仅连合部分被微柔毛,萼片卵形,长约 3 毫米,顶端钝或急尖,无毛,具腺点;花瓣粉红色,广卵形,顶端急尖,长 6(—8)毫米,具腺点,外面无毛,里面近基部被微柔毛或无毛;雄蕊为花瓣长的 2/3,花药卵形,背部具疏腺点;雌蕊与花瓣等长或略长,子房卵珠形,无毛;胚珠 5 枚,1 轮。果球形,直径约 6 毫米,红色,具腺点,果梗有时长达 2 厘米。花期 5—7 月,果期 11—12 月或 5—6 月。

产四川、贵州、云南、广西、广东(海南岛未发现),海拔 1000—2200 米的山谷、山坡疏、密林下,溪边或荫湿的地方。模式标本采于四川峨嵋山。

44. 瑞丽紫金牛(云南植物志) 图版 12:3—4

麂子扣甘树(云南)

Ardisia shweliensis W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 12:194. 1920; Walker, “静生汇报”, 9:165. 1939 et in Philipp. Journ. Sci. 73:123. 1940; 云南植物志, 1:351. 图版 82, 图 3—4. 1977.

灌木,高 1—2 米;枝条无毛,除侧生特殊花枝外,无分枝。叶片膜质,长圆状椭圆形或披针状椭圆形,顶端渐尖,基部楔形,长 8—15 厘米,宽 4—5 厘米,边缘具浅皱波状或近全缘,具边缘腺点,两面无毛,背面具小而密的碎发状腺点,中脉与侧脉于背面隆起,侧脉约 15 对,直达边缘腺点,不连成边缘脉;叶柄长 1—1.5 厘米。复伞形聚伞花序,无毛,着生于侧生特殊花枝顶端,花枝长 7—11 厘米,近顶端有 2—3 片叶;花梗长 1—1.3 厘米,无毛;花长约 7 毫米,花萼仅基部连合,萼片椭圆状卵形或长圆形,顶端近圆形,长 1.2—2 毫米,具腺点,两面无毛;花瓣白色,长约 7 毫米,卵形或卵状披针形,具腺点或无;雄蕊长达花瓣的 3/4,花药披针形,背部无腺点;雌蕊与花瓣近等长,无毛,子房卵珠形;胚珠 6 枚,1 轮。果球形,直径约 7 毫米,红色,无腺点。花期 5—6 月,果期约 11 月。

产云南东南至西南部,海拔 1060—2300 米林下,潮湿的地方。模式标本采于云南瑞丽。

45. 榄色紫金牛

