

Ardisia olivacea Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 127. fig. 25. 1940.

灌木，高约 1 米；茎无毛，幼时具棱，除侧生特殊花枝外，无分枝。叶片膜质或略质，倒披针形或长圆状倒披针形，顶端急尖至渐尖，基部楔形，长 13—24 厘米，宽 4—7 厘米，全缘，具不甚明显的边缘腺点，两面无毛，叶面中脉微凹，背面隆起，具不明显的腺点，腺点微微隆起，侧脉 10—12 对，不连成边缘脉，有时尾端直达边缘腺点；叶柄长 1—2 厘米，有沟。亚伞形花序，单 1，有花 8—10 朵，着生于侧生特殊花枝顶端，花枝长 5—9.5 厘米，无叶，被鳞片或极细的微柔毛，常数枝生于 1 轮；花梗细，长 1—1.5 厘米，被鳞片或微柔毛；花未详；果时萼片广卵形，顶端钝或圆形，长 1—1.5 毫米，腺点不明显，无毛。果球形，直径约 6 毫米，红色，无腺点。 花期未详，果期约 11 月。

产广西（睦边），山坡林下。

46. 少年红（广西） 图版 11:4

念珠藤叶紫金牛（广西）

Ardisia alyxiaefolia Tsiang ex C. Chen, 植物分类学报 16(3): 80. 1978—
A. affinis auct. non Hemsl.: Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 99. 1940, quoad
specim. C. Wang 39589, 40103, Y. Tsiang 5619, S.P. Ko 52621.

小灌木，高约 50 厘米，具匍匐茎；茎纤细，具细纵纹，幼时密被锈色微柔毛，以后无毛。叶片厚纸质至革质，卵形、披针形至长圆状披针形，顶端渐尖，基部钝至圆形，长 3.5—6（—9.5）厘米，宽 1.5—2.3（—3.2）厘米，边缘具浅圆齿，齿间具边缘腺点，两面干时具皱纹，被疏微柔毛或小鳞片，尤以背面中脉为多，腺点微隆起，侧脉不明显，连成不明显的边缘脉；叶柄长 5—8 毫米，具沟。亚伞形花序或伞房花序，稀复伞形花序，侧生，稀腋生，密被微柔毛；总梗长 1—3 厘米，稀达 6 厘米，顶端下弯，长达 6 厘米时，常具 1—2 片退化叶；花梗长 6—10 毫米，通常带红色；花长约 4 毫米，花萼仅基部连合，仅于连合处被细微柔毛，长 1—1.5 毫米，萼片三角状卵形，顶端钝或急尖，具腺点；花瓣白色，稀粉红色，卵形或卵状披针形，顶端渐尖，长约 4 毫米，外面无毛，里面中部以下多少具乳头状突起，具疏腺点；雄蕊较花瓣略短，花药披针形，背部具疏腺点；雌蕊与花瓣等长，子房球形，无毛；胚珠 5 枚，1 轮。果球形，直径约 5 毫米，红色，略肉质，具腺点。 花期 6—7 月，果期 10—12 月，有时 5 月。

产湖南、贵州、广西、广东、海拔 600—1200 米的山谷疏、密林下或坡地。模式标本采于广西象县。

全株用于平喘止咳，亦用于治跌打损伤。

本种常与细罗伞（*A. affinis* Hemsl.）相混，但本种植株较高，叶片较厚且长，基部钝至圆形；花序通常无叶等主要特征，可以区别。

47. 粗梗紫金牛（云南植物志） 图版 12:5—9

Ardisia crassipes C. Y. Wu et C. Chen, 云南植物志, 1: 351. 图版 82, 图 5—9.

