

物志, 3: 173. 1974.

本变种与前者主要区别是, 茎略细; 叶片狭且较小, 倒披针形, 长 5(—12) 厘米, 宽 1.2(—3) 厘米, 花与果均较小。花期 7—8 月, 果期 10 月以后。

产广西、广东(仅海南岛), 见于林下阳处或略干燥的地方。模式标本采于海南岛陵水。

50. 长毛紫金牛(海南植物志) 图版 13: 2

Ardisia villosoides Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 93. fig 17. 1940; 海南植物志, 3: 173. 1974; 云南植物志, 1: 352. 图版 83, 图 2. 1977——*A. villosa* auct. non Roxb.: Walker, l. c. 90, quoad specim. C. Wang 36708, H. Y. Liang 62684.

亚灌木状小灌木, 具匍匐茎, 直立茎高 15—30 厘米, 幼嫩部分密被长柔毛及绒毛。叶片坚纸质, 广椭圆形至广椭圆状卵形, 顶端广急尖或渐尖, 基部钝至圆形, 长 12—15(—22) 厘米, 宽 5—8(—10) 厘米, 边缘具圆齿或圆波状齿, 齿间具边缘腺点, 两面被长柔毛和腺点, 毛以背面中脉为多, 侧脉约 15 对, 常达边缘腺点或多少连成边缘脉; 叶柄长 1.5—3.5 厘米, 密被长柔毛及绒毛。复亚伞形花序或聚伞花序, 腋生或侧生, 常着生于茎上部, 密被长柔毛及绒毛, 总梗长约 1 厘米或略长; 花梗长 6—10 毫米, 均被长柔毛; 花长约 6 毫米, 花萼仅基部连合, 长约 6 毫米, 萼片长圆状披针形至舌形, 两面被长柔毛和腺点; 花瓣粉红色, 卵形, 顶端急尖, 长约 6 毫米, 无毛, 具腺点; 雄蕊较花瓣略短, 花药狭披针形, 背部具腺点; 雌蕊与花瓣等长或略长, 子房球形, 无毛; 胚珠 5 枚, 1 轮。果球形, 直径约 6 毫米, 红色, 无毛, 具腺点(原描述无腺点)。花期 6—7 月, 果期 12 月至翌年 2 月。

产广东(仅海南岛)、云南, 见于山谷密林下或林缘、溪旁及荫湿的地方, 有时亦见于路边或竹林下。越南亦有。模式标本采于海南岛保亭。

51. 虎舌红(广东、四川) 图版 13: 3—4

红毛毡(贵州、广西), 老虎脬(两广), 螭蜥皮、豺狗舌、红毡(广东), 肉八爪、红毛针(云南), 白毛毡、毛地红(广西)

Ardisia mamillata Hance in Journ. Bot. Brit. et For., 22: 290. 1884; Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236): 153. 1902; Pitard in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 3: 854. 1930; Walker in Philipp. Journ. Sci. 73: 97. 1940; 中国高等植物图鉴, 3: 219. 图 4392. 1974; 海南植物志, 3: 173. 1974; 云南植物志, 1: 354. 图版 83, 图 3—4. 1977——*Tinus mamillata* O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 974. 1891.

矮小灌木, 具匍匐的木质根茎, 直立茎高不超过 15 厘米, 幼时密被锈色卷曲长柔毛, 以后无毛或几无毛。叶互生或簇生于茎顶端, 叶片坚纸质, 倒卵形至长圆状倒披针形, 顶

图版 13: 1. 雪下红 *Ardisia villosa* Roxb. var. *villosa*, 果枝; 2. 长毛紫金牛 *A. villosoides* Walker, 植株 1/2; 3—4. 虎舌红 *A. mamillata* Hance, 3. 植株, 4. 叶片毛被放大; 5. 莲座紫金牛 *A. primulaefolia* Gardn. et Champ., 植株。(李锡畴绘)

