

出1—2个,总梗长3—5.5(—19)厘米;花梗长6—8毫米,均被密锈色长柔毛;花长4—6毫米,花萼仅基部连合,萼片长圆状披针形,顶端急尖,与花瓣近等长,具腺点和缘毛,外面被锈色长柔毛,里面无毛;花瓣粉红色,广卵形,顶端急尖,具腺点,两面无毛;雄蕊较花瓣略短,花药披针形,顶端急尖,背部具疏腺点;雌蕊较花瓣略短,子房球形,被疏微柔毛;胚珠3—4枚,1轮。果球形,直径4—6毫米,略肉质,鲜红色,具疏腺点,被柔毛或几无毛。

花期6—7月,果期11—12月,有时延至4—5月。

产云南、广西、广东、江西、福建,海拔600—1400米的山坡密林下,荫湿的地方。越南亦有。模式标本采于香港。

全草供药用,可补血,治癆伤咳嗽、风湿、跌打等;亦用于治疮疥和毛虫刺伤等。

组6.锯齿组 Sect. *Bladhia* (Thunb.) Mez in Pflanzenreich 9(IV. 236); 150. 1902, „pro subgen.; Walker in Philipp. Journ. Sci. 73; 129. 1940——*Bladhia* Thunb., Nov. Gen. Pl. 6. 1781.

直立小灌木或匍匐上升亚灌木状小灌木或近草本,具匍匐状的根茎;叶缘具锯齿或锯齿状细齿,无边缘腺点;聚伞花序或稀总状花序,或由上述花序组成圆锥花序或金字塔形大型圆锥花序;萼片披针形或卵形,顶端渐尖或急尖,果时通常不反卷,花瓣基部短短连合,将开的花蕾,花柱通常不伸出;胚珠通常5枚,少有6—10枚,稀更多,1或数轮。

53. 紫脉紫金牛(云南植物志) 图版14:1—3

Ardisia velutina Pitard in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 3; 813. 1930; 云南植物志, 1; 355. 图版84, 图1—3. 1977.

灌木,高0.5—2米;除侧生特殊花枝外,无分枝,密被紫红色长柔毛。叶轮生,叶片纸质,披针形或椭圆形,顶端渐尖,基部楔形,下延或微微下延,通常长15—22厘米,宽3.8—5(—6)厘米,稀倒卵形,长25厘米,宽8厘米,边缘具不整齐的细锯齿,两面被疏细微柔毛,以背面较多,或两面几无毛,叶面中、侧脉微凹,背面隆起,紫红色,侧脉约18对,与中脉几成直角,尾部成不明显的边缘脉;细脉网状,网眼具碎发状腺点;叶柄长1—1.5厘米或由于叶基部下延而几无柄。复伞形花序,着生于侧生特殊花枝顶端,花枝长6—10厘米,稀达12厘米,近顶端具2—3片披针形小叶,小叶长通常不超过10厘米;总梗长3—5毫米,常下弯,密锈色长柔毛;花梗长7—12毫米,密被锈色长柔毛;花长约5毫米,花萼仅基部连合,密被锈色长柔毛,萼片披针形,长约2.5毫米,具腺点和长缘毛,里面无毛;花瓣粉红色至紫红色,广卵形,长约5毫米,顶端广急尖且钝,具细腺点,无毛;雄蕊较花瓣略短,花药广卵形,背部无腺点,顶端细尖;雌蕊与花瓣等长或略长,子房卵形,无毛或被微柔毛;胚珠10枚,2轮。果球形,直径约6毫米,被锈色微柔毛,具腺点。花期4—5月,果期约9月,有时上部花枝在开花,下部枝果熟。

产云南、广西,海拔550—1800米的石灰岩山坡密林下,荫湿的地方,或山谷林下荫湿

处。越南亦有。

54. 月月红

毛虫草(广西),木步马胎、红毛走马胎(四川),毛青杠(西南三省),江南紫金牛(中国高等植物图鉴)

Ardisia faberi Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 64. 1889; Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236): 153. 1902; Walker, “静生汇报”, 9: 166. 1939 et in Philipp. Journ. Sci. 73: 133. 1940; 中国高等植物图鉴, 3: 225. 图 4404. 1974; 云南植物志, 1: 355. 图版 84, 图 4. 1977——*Tinus faberi* O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 974. 1891——*A. castaneifolia* Lèvl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9: 461. 1911——*A. cavaleriei* Lèvl. in l. c. 10: 374. 1912.

54a. 月月红(原变种) 图版 14: 4

var. *faberi*

小灌木或亚灌木,具匍匐生根的根茎,近蔓生,长 15—30 厘米,无分枝,密被锈色卷曲长柔毛。叶对生或近轮生,叶片厚膜质或坚纸质,卵状椭圆形或披针状椭圆形,顶端渐尖,基部楔形,长 5—10 厘米,宽 2.5—4 厘米,边缘具粗锯齿,幼时两面被卷曲的长柔毛,以后叶面仅中脉和侧脉被毛,背面中、侧脉明显,隆起,毛尤多,无边缘脉;叶柄长 5—8 毫米,密被卷曲的长柔毛。亚伞形花序,腋生或生于节间互生的钻形苞片腋间,总梗长 1.5—2.5 厘米,花梗长 7—10 毫米,二者均被卷曲长柔毛;花长 4—5(—6)毫米,花萼基部几分离,萼片狭披针形或线状披针形,长约 5 毫米,外面密被长柔毛,里面无毛;花瓣白色至粉红色,广卵形,顶端急尖或钝,长 4—5(—6)毫米,多少具腺点,无毛;雄蕊长为花瓣的 2/3,花药卵形,背部无腺点;雌蕊与花瓣近等长,子房卵珠形,无毛;胚珠 5 枚,1 轮。果球形,直径约 6 毫米,红色,无腺点,无毛或被微柔毛。花期 5—7 月,稀 4 月,果期 5 月或 11 月。

产广东以西,湖北以南各省区,海南岛不产,海拔 1000—1300 米的山谷疏、密林下,荫湿处,水旁、路边或石缝间。模式标本采于四川峨眉山。

根、叶用于治感冒咳嗽、蛾喉等。

54b. 短柄月月红(海南植物志)(变种)

var. *oblanceifolia* C. Chen, 海南植物志, 3: 174, 576. 1974.

本变种与前者主要区别是,叶片倒披针形,顶端急尖,基部渐狭,楔形,长 7—10 厘米,宽 1.8—2.5 厘米,两面仅中脉被长柔毛;叶柄长 3—5 毫米。花期未详,果期约 1 月。

产广东(仅海南岛),山间林下。模式标本采于海南岛保亭。

55. 九节龙(中国高等植物图鉴) 图版 11: 5—8

矮茶子(江西),蛇药(广东),狮子头(广西),轮叶紫金牛(台湾)

Ardisia pusilla A. DC. in Trans. Linn. Soc. 17: 126. 1834 et DC., Prodr.

