

常较狭,呈倒披针形,花序多枝。

60. 走马胎(本草纲目拾遗,广东)

马胎(广东),山猪药(海南岛),走马风(广西)

*Ardisia gigantifolia* Stapf in Kew Bull. 74. 1906; Walker, “静生汇报”, 9: 167. 1939, in Philipp. Journ. Sci. 73: 141. 1940, excl. specim. H. T. Tsai 51865 et in Journ. Arn. Arb. 23: 354. 1942; 中国高等植物图鉴, 3: 226. 图 4406. 1974; 海南植物志, 3: 174. 1974; 云南植物志, 1: 357. 1977——*A. pseudoverticillata* Merr. in Journ. Arn. Arb. 8: 13. 1927; Chun in Sunyatsenia 1: 287. 1934.

大灌木或亚灌木,高约 1 米,有时达 3 米,具粗厚的匍匐生根的根茎;直立茎粗壮,直径约 1 厘米,通常无分枝,幼嫩部分被微柔毛,以后无毛。叶通常簇生于茎顶端,叶片膜质,椭圆形至倒卵状披针形,顶端钝急尖或近渐尖,基部楔形,下延至叶柄成狭翅,长 25—48 厘米,宽 9—17 厘米,边缘具密啮蚀状细齿,齿具小尖头,两面无毛或仅背面叶脉上被细微柔毛,具疏腺点,以近边缘较多,腺点于两面隆起,侧脉 15—20 对或略多,不成边缘脉;叶柄长 2—4 厘米,具波状狭翅。由多个亚伞形花序组成的大型金字塔状或总状圆锥花序,长 20—35 厘米,宽约 10 厘米或更宽,无毛或被细微柔毛,每亚伞形花序有花 9—15 朵;花梗长 1—1.5 厘米,花长 4—5 毫米,花萼仅基部连合,萼片狭三角状卵形或披针形,顶端急尖,长 1.5—2 毫米,被疏微柔毛,具腺点,缘毛不明显;花瓣白色或粉红色,卵形,长 4—5 毫米,具疏腺点;雄蕊为花瓣长的 2/3,花药卵形,背部无腺点;雌蕊与花瓣几等长,子房卵珠形,几无毛或被微柔毛;胚珠数枚,1 轮。果球形,直径约 6 毫米,红色,无毛,具纵肋,多少具腺点。花期 4—6 月,有时 2—3 月,果期 11—12 月,有时 2—6 月。

产云南、广西、广东、江西、福建,海拔 1300 米以下的山间疏、密林下,荫湿的地方。越南北部亦有。模式标本采于我国南部采回的种子栽种出来的植株。

为民间常用的跌打药,广东地区有“两脚行不开,不离走马胎”之说,可见其对恢复疲劳,活血、行血等方面的功效,根茎及全株用于祛风补血、活血散瘀、消肿止痛,外敷治痈疔溃烂。亦作兽药。

61. 粗茎紫金牛(云南植物志) 图版 14:5—7

*Ardisia dasyrhizomatica* C. Y. Wu et C. Chen, 云南植物志, 1: 358. 图版 84, 图 5—7. 1977.

小灌木,具粗厚的匍匐生根的根茎,直径约 1 厘米;直立茎不分枝,高约 50 厘米,粗 7—10 毫米,无毛。叶通常聚集于茎顶端,叶片坚纸质,广椭圆状倒卵形或倒卵形,顶端广急尖或钝,基部下延而成狭翅,长 23—35 厘米,宽 11—16 厘米,边缘具紧密的啮蚀状齿,齿具小尖头,干时常反折于叶背,两面被细微柔毛,具极疏腺点,腺点于两面隆起,侧脉约 15 对;细脉近平行成梯形;叶柄具皱波状翅。由具极短总梗的伞形花序组成总状花序或圆锥花序,生于茎顶端叶腋,长 8—9 厘米,每个伞形花序有花 4—6 朵,花梗长 1 厘米或略