

Embelia subcoriacea (C. B. Clarke) Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236), 329. 1902; Pitard in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 3, 800. 1930; Walker, “静生汇报”, 9, 174. 1939 et in Philipp. Journ. Sci. 73, 180. 1940, excl. specim. C. W. Wang 71938; 中国高等植物图鉴, 3, 229. 图 4412. 1974; 云南植物志, 1, 374. 图版 88, 图 10—12. 1977——*E. nagushia* var. *subcoriacea* C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3, 516. 1882——*E. sp.* Walker, l. c. 184, specim. C. W. Wang 73503.

攀援灌木或小乔木状, 高 3—5 米; 枝条多少具瘤或皮孔。叶片革质或坚纸质, 倒卵形或倒卵状椭圆形, 顶端急尖或突然渐尖, 基部楔形, 长 8—15 厘米, 宽 3.5—6.5 厘米, 全缘, 两面无毛, 具腺点, 有时腺点伸长呈碎发状, 并从中脉与侧脉平行向两侧放射, 叶面中脉微凹, 侧脉不明显, 背面中脉隆起, 侧脉很多; 叶柄长 1—1.5 厘米。总状花序, 着生于次年无叶小枝叶痕上, 长 3—5 厘米, 幼时被微柔毛, 基部具覆瓦状排列的苞片; 花梗长约 5 毫米, 多少被微柔毛; 小苞片狭披针形或倒戟形, 具疏缘毛; 花 4 数, 长约 3 毫米, 花萼仅基部连合, 萼片卵形至三角形, 稀广卵形, 顶端急尖或钝, 具缘毛, 两面无毛, 多少具腺点; 花瓣淡绿色或黄白色, 分离, 卵形或长圆状卵形, 顶端圆形或钝, 外面无毛, 里面密被微柔毛, 具缘毛, 多少具腺点; 雄蕊在雄花中超出花瓣, 花药背部具腺点, 雌蕊退化; 雌花未详。果扁球形, 直径 0.8—1 厘米, 稀达 1.3 厘米, 深红色, 具密腺点, 具纵肋, 宿存萼反卷。花期 4—5 月, 稀 8 月, 果期 9—12 月。

产贵州、云南、广西, 海拔 1400—2300 米的山谷、山坡密、疏林中。印度, 越南, 老挝, 泰国, 柬埔寨等亦有分布。

果可生食, 味酸甜, 并可药用, 可驱蛔虫。

18. 肉果酸藤子(云南植物志) 图版 19:1

Embelia carnosisperma C. Y. Wu et C. Chen, 云南植物志, 1, 374. 图版 89, 图 1. 1977.

攀援灌木, 枝条粗糙, 无毛。叶片革质, 略厚, 椭圆状倒卵形至披针状倒卵形, 稀倒卵形, 顶端短急尖, 基部楔形, 长 8—10.5 厘米, 宽 3.5—6.3 厘米, 全缘, 两面无毛, 叶面中脉微下凹, 侧脉微隆起, 背面中、侧脉均隆起, 密布腺点, 侧脉很多, 连成略远的边缘脉; 叶柄长 1.3—2.8 厘米, 粗糙。总状花序, 腋生, 长 2—3 毫米, 被微柔毛, 花未详。果扁球形, 直径约 2.7 厘米(未熟), 肉质, 密布腺点, 无毛, 宿存萼反卷, 萼片 4, 三角状卵形, 两面无毛, 全缘, 具腺点; 果梗粗壮, 长约 1 厘米, 粗约 3 毫米。花期未详, 果期 7—8 月。

产云南, 海拔 1240—1400 米的山谷疏、密林中潮湿的地方。

本种与大叶酸藤子(*E. subcoriacea* [C. B. Clarke] Mez) 相似, 但本种叶片较厚, 果大, 直径约 2.7 厘米, 肉质, 具密腺点, 果梗粗约 3 毫米等, 可予之区别。

19. 长叶酸藤子(海南植物志) 图版 19:2—3

没归息(云南德宏地区景颇语译音), 吊罗果(广西)

