

5. 铁仔属——*Myrsine* Linn.

Linn., sp. Pl. 196. 1753 et Gen. Pl. ed. 2, 90. 1754; Walker in Philipp. Journ. Sci. 73, 184. 1940; 海南植物志, 3, 178. 1974; 云南植物志, 1, 377. 1977—*Anantia* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo 37, 39. 1923; Nakai in Nakai et Honda, Nov. Fl. Jap. 9, 131. 1943.

矮小灌木或小乔木, 直立, 被毛或无毛。叶通常具锯齿, 稀全缘, 无毛, 有时具腺点; 叶柄通常下延至小枝上, 使小枝成一定的棱角。伞形花序或花簇生, 腋生, 侧生或生于无叶的老枝叶痕上, 每花基部具 1 苞片; 花 4—5 数, 两性或杂性, 长 2—3 毫米; 花萼近分离或连合达全长的 1/2, 萼片覆瓦状排列, 通常具缘毛及腺点, 宿存; 花瓣几分离, 稀连合达全长的 1/2, 具缘毛及腺点; 雄蕊着生于花瓣中部以下, 与花瓣对生; 花丝分离或基部连合; 花药卵形或肾形, 2 室, 纵裂; 雌蕊无毛或几无毛, 子房卵形或近椭圆形, 花柱圆柱形, 柱头点尖或扁平, 流苏状或锐裂; 胚珠少数, 1 轮。浆果核果状, 球形或近卵形, 内果皮坚脆, 有种子 1 枚; 胚乳坚硬, 嚼烂状; 胚圆柱形, 横生。

约 5(—7) 种, 从亚速尔群岛经非洲, 马达加斯加, 阿拉伯, 阿富汗, 印度至我国中部。我国有 4 种, 分布于长江流域以南各地。

分 种 检 索 表

1. 叶片长 5 厘米或较短, 宽 1.5 厘米以下; 小枝被短柔毛……………1. 铁仔 *M. africana* Linn.
2. 叶片椭圆状倒卵形, 有时近圆形、倒卵形、长圆形或披针形, 长 1—2 厘米, 稀达 3 厘米, 宽 0.7—1 厘米, 顶端广钝或近圆形, 具短刺尖, 边缘常中部以上具齿(产甘肃、陕西、湖北、湖南、广西、西南三省及西藏)……………1a. 铁仔 *M. africana* Linn. var. *africana*
2. 叶片椭圆形, 长 2—5 厘米, 宽 1—1.6 厘米, 顶端短渐尖, 边缘全具齿(产云南)……………1b. 尖叶铁仔 *M. africana* Linn. var. *acuminata* C. Y. Wu et C. Chen
1. 叶片长通常 3 厘米以上, 宽 1.5 厘米以上; 小枝无毛。
 3. 花通常 5 数; 叶背面具小窝孔, 叶柄不下延, 边缘通常全缘, 有时中部以上具 1—2 对疏齿。
 4. 叶片广椭圆形, 顶端广急尖具尖头, 长 3—5 厘米, 全缘(产广西)……………2. 广西铁仔 *M. elliptica* Walker
 4. 叶片椭圆状披针形, 顶端渐尖或长渐尖, 长 6—8(—10) 厘米, 全缘或有时中部以上具 1—2 对齿(产浙江、福建、台湾、贵州、云南、广西、广东)……………3. 光叶铁仔 *M. stolonifera* (Koidz.) Walker
 3. 花通常 4 数; 叶背面无小窝孔, 叶柄下延至小枝上, 边缘中部以上具锐齿牙(产华中、华南、西南及西藏, 海南岛不产)……………4. 针齿铁仔 *M. semiserrata* Wall.

1. 铁仔

簸赭子(植物名实图考), 野茶(陕西), 明立花(广西), 矮零子、豆瓣柴(贵州), 碎米果、铁帚把、牙痛草(云南), 小铁子, 炒米柴

Myrsine africana Linn., sp. Pl. ed. 1, 196. 1753; A. DC. in DC., Prodr. 8, 93.