

木材坚硬,是极好的薪炭柴,木炭民间用作打铁的燃料。

4. 平叶密花树(海南植物志)

小黑果、马木树(云南),尖叶密花树(中国高等植物图鉴)

Rapanea faberi Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV.236):358.1902; Walker, “静生汇报”, 9:183.图 24.1939 et in Philipp. Journ. Sci. 73:197. fig. 36. 1940; 中国高等植物图鉴, 3:232.图 4417; 1974; 海南植物志, 3:179. 1974; 云南植物志, 1:383. 1977.

乔木,高达 6 米或更高;小枝无毛,暗黑色或灰黑色。叶片坚纸质或近革质,椭圆形至披针形,顶端细急尖或渐尖,基部楔形,长 7—11 厘米,宽 1.5—3 厘米,全缘,两面无毛,叶面中脉下凹,背面中脉隆起,侧脉不明显,近边缘连成边缘脉,细脉不明显,边缘多少具腺点;叶柄长约 1 厘米。花簇生,着生于成覆瓦状排列的苞片的小短枝上,小短枝腋生或生于落叶的枝条上;苞片卵形,顶端钝,边缘具疏乳头状突起,两面无毛;花梗长 1—2 毫米,无毛;花 5 数,长约 3 毫米,花萼基部连合,长 1 毫米或略短,萼片卵形,具腺点,边缘具细乳头状突起;花瓣淡绿色,长圆形或卵形,长约 3 毫米,基部连合达全长的 1/3,具腺点,边缘和里面具乳头状突起,但于基部连合部分极少或无;雄蕊无花丝,花药较花瓣略小,同形,顶端有时具微柔毛;雌蕊较花瓣略短,子房长圆状卵形,无毛,柱头伸长,舌状,顶端尖,与子房等长。果球形或卵形,直径 5—6 毫米,黑色,无毛,干时略有纵纹,无腺点。花期 4—5 月,果期 10—12 月。

产四川、云南、广西、广东(仅海南岛),海拔 500—1200 米的混交林或疏林中,沟边及荫湿处。

5. 打铁树(广西)

雀仔肾(广西),辣草、烧灰树(广东〔海南岛〕),钝叶密花树(中国高等植物图鉴)

Rapanea linearis (Lour.) S. Moore in Journ. Bot. Brit. et For. 63:249. 1925; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 11:52.1932 et in Trans. Amer. Philos. Soc. n. ser. 24:300. 1935; Walker in Philipp. Journ. Sci. 73:200. 1940; 中国高等植物图鉴, 3:232.图 4418.1974; 海南植物志, 3:180.1974——*Athruphyllum lineare* Lour., Fl. Cochinch. 120.1790, ed. Willd. 148. 1793——*Myrsine linearis* Poir. in Lam, Encycl. Suppl. 3:709.1813——*M. playfairii* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26:61.1889——*Rapanea playfairii* Mez in Engl., Pflanzenreich 9(IV. 236):361.1902.

灌木或乔木,高 1—8 (—30?) 米,分枝多;幼时密被鳞片,以后脱落,无毛,具纵纹。叶通常聚于小枝顶端,叶片坚纸质,稀近革质,倒卵形或倒披针形,稀椭圆状披针形,顶端圆形或广钝,有时急尖且微凹,长 3—7 厘米,宽 1.2—2.5 厘米,全缘,两面无毛,干时叶面颜色较深,中脉平整,侧脉及细脉不明显,背面中脉明显,隆起,侧脉(约 8—10 对)及细脉微隆起,密布腺点,腺点微隆起。花簇生或成伞形花序,有花 4—6 朵或更多,着生于具覆瓦