

状排列的苞片的小短枝顶端,小短枝腋生或生于老枝叶痕上;苞片广卵形,顶端钝,边缘具疏乳头状突起;花梗长(2—)4毫米;无毛;花(4—)5数,稀6数,长2—2.5毫米,花萼基部连合,长约1毫米,萼片卵形,顶端钝,多少具腺点,边缘具乳头状突起;花瓣白色或淡绿色,长约2.2毫米,基部连合达全长的1/3,裂片椭圆状卵形,边缘和里面具乳头状突起,具疏腺点,连合部分无毛;雄蕊着生于花冠管喉部,与裂片几等长,花丝极短或无,花药与花冠裂片同形,几等大,顶端具微柔毛;雌蕊不伸出花冠,子房卵珠形,无毛,花柱极短,柱头舌状或微裂。果球形,直径3—4毫米,紫黑色,常具皱纹,多少具腺点。花期12月至翌年1月,果期7—9月或11月。

产贵州、广西、广东,山间疏、密林中或荒坡灌丛中,或石灰岩山灌丛中。越南亦有。

6. 广西密花树(云南植物志)

Rapanea kwangsiensis Walker in Journ. Washington Acad. Sci. 21: 479. fig. 4. 1931 et in Philipp. Journ. Sci. 73: 198. fig. 37. 1940; 云南植物志, 1: 383. 图版90, 图1. 1977.

6a. 广西密花树 (原变种) 图版20:1

var. *kwangsiensis*

小乔木,高5—6米;小枝无毛,有纵纹。叶片革质,倒卵形,顶端广急尖或钝,基部楔形,长16—21厘米,宽6—8厘米,全缘,边缘微反卷,两面无毛,叶面中、侧脉扁平,背面中脉明显,隆起,侧脉微隆起,连成边缘脉。伞形花序或花簇生,着生于具覆瓦状排列的苞片的小短枝上,小短枝腋生或侧生于无叶的叶痕上;苞片广卵形,两面无毛,具疏缘毛;花梗长4—6(—8)毫米,无毛;花5数,稀6数,长约4毫米,花萼基部连合达1/3—1/2,萼片卵形,长1(—2)毫米,顶端急尖,全缘,两面无毛,边缘有时具疏乳头状突起,腺点不明显;花瓣仅基部连合或连合达1/3,长约4毫米,长圆状披针形,具腺点,两面无毛或里面具乳头状突起,具疏缘毛;雄蕊在雌花中花丝极短,花药与花瓣同形且略小,在雄花中未详;雌蕊在雌花中较花瓣短,子房卵形或近球形,无毛,花柱极短,柱头微裂或近舌状,近顶端常具腺点。果球形或卵形,直径4—5毫米,紫色或紫红色,具纵肋和纵行腺点。花期约5月,果期约4月。

产贵州、云南、广西,海拔650—1000米的山谷混交林中,或石灰岩山杂木林中。

6b. 狭叶密花树(云南植物志)(变种) 图版20:2

var. *lanceolata* C. Y. Wu et C. Chen, 云南植物志, 1: 383. 图版90, 图2. 1977.

本变种与前者主要区别是,叶片狭长圆状倒披针形或狭长圆形,长14—24厘米,宽3.5—5厘米,顶端渐尖,基部楔形。

产云南,海拔1200—1500米的石灰岩山杂木林中。模式标本采于云南金平。

7. 密花树

狗骨头(云南),哈雷(云南傣族语译音),打铁树(海南岛),大明橘(台湾)