

无翅。叶互生,在当年新抽出的茎端稍密聚,卵形、卵状椭圆形至卵状披针形,长6—11厘米,宽3—6厘米,先端渐尖,基部近圆形或阔楔形,上面榄绿色,具极密的小点,无毛,下面淡绿色,侧脉4—5对,在下面隆起,具极密网脉;叶柄长1.5—3厘米。花2—6朵形成近顶生或腋生的总状花序,花序轴长3—40毫米;花梗纤细,长2.5—4厘米,最下方的苞片叶状,卵状披针形,长达4.5厘米,宽达3厘米,向先端渐次变小成钻形,长仅5毫米;花萼长约2.5毫米,深裂近达基部,裂片卵状披针形,边缘近膜质,具腺体;花冠柠檬黄色,分裂近达基部,裂片长圆形,长约10毫米,宽约5毫米,先端钝;花丝下部连合成浅环并与花冠基部合生,分离部分极短,约与花药的心形基部等长;花药长5毫米,顶端钝,孔裂;子房卵珠形,无毛;花柱长约6毫米。花期5月。

产于云南东南部(麻栗坡、富宁、广南、西畴)。生于混交林下,海拔1000—1500米。模式标本采自富宁县龙迈。

本种与近缘种 *L. chapaensis* Merr. 的主要区别在于花药顶孔开裂。经检查后一种的同模式 (A. Petelot 6347), 其花药确为纵裂。

12. 岩居香草(植物分类学报)

Lysimachia saxicola Chun et F. Chun ex Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. 17: 26. 1979.

12a. 岩居香草(原变种) 图版 5:1—2

var. *saxicola*

株高10—18厘米,干后不香。茎直立或下部倾卧,木质,基部圆柱形,直径约2毫米,上部微具棱,不分枝,顶端具叶,下部仅有少数鳞片状叶。叶互生,3—4枚密聚于茎端,卵圆形,长4.5—6.5厘米,宽3—4.5厘米,先端锐尖,基部圆形,边缘软骨质,明显增厚,微呈皱波状;软骨质周边淡黄褐色,中间有一沟槽,因而成双层状;叶片亚革质,上面绿色,下面较淡,侧脉4—5对,在上面稍凹陷,在下面隆起,网脉两面均明显;叶柄长5—8毫米。花2—4朵形成极短的总状花序,生于茎端叶腋和茎下部鳞片状叶腋;花序轴长仅0.5—2毫米,因而花成簇生状;苞片披针形至钻形,长2—4毫米;花梗长2—5毫米;花萼长约3毫米,分裂近达基部,裂片卵形,先端渐尖,内面及边缘密被腺体;花冠黄色,长7毫米,几自基部分裂成长圆形裂片;花丝基部与花冠合生约0.5毫米,分离部分长约0.7毫米;花药长4毫米,顶孔开裂。子房卵珠形,花柱长约4毫米。花期7月。

产于广西西北部。生于石灰岩上,海拔2500米。模式标本采自南丹,芒场。

12b. 小岩居香草(变种)

var. *minor* C.F. Liang ex Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. 17: 26. 1979.

植物体各部均较小。茎高4—8厘米,四棱形;叶卵圆形,长2—4厘米,宽1.5—3厘米,基部阔楔形或近圆形,上面沿边缘有一圈小刚毛。

产于广西西北部。生于石灰岩上。模式标本采自河池县。