

显;茎下部叶退化成鳞片状。总状花序多花,生于上部叶腋和下部鳞片状叶腋,由于花序轴极度缩短而成簇生状;花梗长 0.5—2 厘米,密被红褐色腺体;花萼长 6—8 毫米,分裂几达基部,裂片卵状披针形,宽约 2 毫米,外面疏被、内面密被褐色小腺体,略具肋;花冠黄色,与花萼近等长,裂片卵状长圆形,长约 8 毫米,宽 2.5—3.5 毫米;花丝下部合生成极短的环,分离部分长约 1 毫米;花药长 4—5 毫米,顶孔开裂。花柱与雄蕊等长或略超出。蒴果球形,直径 2—3 毫米,5 瓣裂。花期 6 月。

产于广西中部。生于石灰岩山地灌丛中。模式标本采自忻城县。

16. 邕宁香草(植物分类学报) 图版 6: 3—4

*Lysimachia heterobotrys* Chen et C.M.Hu in Act. Phytotax. Sin. 17: 27. 1979.

株高 7—40 厘米,干后不香。茎膝曲直立,具棱角,棱边有狭翅,上部多少被无柄腺体,基部常木质化。叶互生,椭圆形,长 6.5—13 厘米,宽 3—6.5 厘米,先端锐尖,基部渐狭,下延至叶柄,边缘极狭内卷,干时上面变深褐色,无毛,下面灰褐色,密被白色的球状小腺体,侧脉 6—8 对,在下面隆起,网脉较密,两面均明显;叶柄长 5—15 毫米,密被无柄腺体。总状花序由 4—9 花组成,生于茎端及上部叶腋的长 2.5—10 厘米,生于茎下部叶腋的花序轴极短,花成簇生状;苞片叶状,最下方的长达 1.5 厘米,向梢端渐次变小;花梗纤细,长 1.3—2.5 厘米;花萼长 6 毫米,果时增大可达 8 毫米,分裂近达基部,裂片披针形,先端渐尖成钻形,具极狭的膜质边缘,两面密被无柄腺体;花冠黄色,长约 7 毫米,分裂近达基部,裂片披针形,先端锐尖,下部宽约 2.5 毫米;花丝基部连合成浅环并与花冠合生约 0.3 毫米,分离部分丝状,长约 1 毫米;花药长约 4.5 毫米,顶孔开裂;子房卵珠形,上部有腺体。蒴果近球形,褐色,长约为宿存花萼的一半,瓣裂。花期 5—6 月;果期 8—9 月。

产于广西南部(大新、邕宁)。生于山坡林下及灌丛中。模式标本采自大新县。

17. 纤柄香草(植物分类学报) 图版 7: 1

*Lysimachia filipes* C.Z.Gao et D. Fang in Act. Phytotax. Sin. 19:361. fig. 3.1981.

植株高 20—50 厘米,干后有香气。茎纤细,具 4 棱,下部着地生根而长成新植株。叶互生,卵形至卵状披针形,通常上部叶较下部叶约大 1 倍,长 5—13 厘米,宽 2—4 厘米,先端渐尖或长渐尖,基部圆型至浅心形,两侧稍不对称,背面密被白色小点,侧脉在上面微凹,背面突起,网脉两面明显;叶柄长 2 毫米或近于无柄。总状花序 4—15 花,顶生和腋生,花序轴纤细,长 5—20 厘米;花梗长 2—3 厘米;苞片钻形,长 2—3 毫米;花萼分裂近达基部,裂片卵状披针形,长约 2 毫米,内面密被褐色腺体;花冠黄色,分裂近达基部,裂片狭椭圆形,长 7—10 毫米,宽约 2 毫米,花开时反卷;花丝基部合生成短环,分离部分长约 1 毫米;花药长 4—5 毫米,顶孔开裂;花柱与雄蕊等长或略超出。蒴果球形,直径约 3 毫米。花期 6 月。

产于广西西北部。生于石山岩洞内。模式标本采自凤山县。

18. 条叶香草(植物分类学报) 图版 8: 1—2

*Lysimachia vittiformis* Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. 17: 27. 1979.



1. 纤柄香草 *Lysimachia filipes* C.Z. Gao et D. Fang 植株。2—4. 细梗香草 *Lysimachia capillipes* Hemsl.: 2. 植株, 3. 花, 4. 花冠展开示雄蕊。(邓晶发绘)