

株高约 40 厘米,干后不香。茎簇生,直立,基部圆柱形,稍木质化,直径约 2 毫米,上部微具棱,密被短柄腺体,下部有分枝,上部常自叶腋发出长仅 3—8 毫米的短枝。叶互生,线形,长 3—8.5 厘米,宽 2.5—6 毫米,先端渐尖,有时稍呈镰状弯曲,基部渐狭成极短的柄,边缘极狭内卷,干时坚纸质,变褐色,两面无毛,密生不明显的小腺体,中肋在上面微凹陷,在下面隆起,侧脉不明显。花单出腋生;花梗纤细,丝状,长 1—2 厘米,果时增长可达 3 厘米;花萼长 1.5 毫米,深裂近达基部,裂片卵形,先端渐尖,内面及边缘密被腺体;花冠黄色,长 5—6 毫米,分裂近达基部,裂片近线形,下部宽约 1.5 毫米,上部稍狭,顶端钝;花丝基部与花冠合生约 0.4 毫米,分离部分长约 0.5 毫米;花药长约 3.2 毫米,顶孔开裂;花柱长约 4 毫米。蒴果近球形,白色,直径约 3 毫米,瓣裂。花期 5 月,果期 8—9 月。

产于广西西北部。生于山坡阴处。模式标本采自田林县。

19. 海桐状香草(植物分类学报) 图版 8: 3—4

Lysimachia pittosporoides C. Y. Wu, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 39. 1965; Chen et C.M.Hu in Act. Phytotax. Sin. 17:27. 1979.

株高 50—100 厘米,干后不香。根坚硬,簇生,红褐色;茎直立,极多分枝,木质,下部微具棱,上部明显 4 棱形,幼时多少具无柄腺体。叶互生,在每次新梢的顶端稍密聚,因而形成近等距离的多层叶轮,叶片倒披针形,长 2—4 厘米,宽 0.4—1 厘米,先端锐尖,基部渐狭,边缘明显内卷,近革质,干时易变黄褐色,上面密被不明显的凹陷小点,下面密被无柄小腺体,中肋在上面凹陷,在下面隆起,二次脉两面均不明显;叶柄长 2—4 毫米。花单出腋生;花梗纤细,长 1—2 厘米;花萼长达 5 毫米,深裂近达基部,裂片自卵圆形的基部尾状渐尖成钻形,内面及边缘疏被腺体;花冠黄色,长 6—7 毫米,分裂近达基部,裂片长圆形,宽 3—4 毫米,先端钝;花丝基部与花冠合生达 0.5 毫米,分离部分长约 0.6 毫米;花药长约 4 毫米,基部微呈心形,向上渐狭,顶孔开裂;花柱长约 4 毫米。蒴果球形,脆壳质,淡褐色,直径 3—4 毫米,比萼片短,瓣裂。花期 4—5 月。

产于云南东南部(麻栗坡、西畴)。生于石灰岩山地混交林下及灌丛中,海拔 1400—1800 米。模式标本采自西畴。

20. 田阳香草(植物分类学报)

Lysimachia tianyangensis D. Fang et C. Z. Gao in Act. Phytotax. Sin. 19: 363. fig. 4. 1981.

茎近丛生,直立,高约 30 厘米,中上部分枝多而密,木质,具细纵条纹和短柄腺体。叶互生,椭圆形或菱状椭圆形,长 6—9 毫米,宽 1.5—3 毫米,先端急尖,具锐尖头,基部楔形,下延,坚纸质,边缘内卷,两面密被腺体,中脉在上面平坦,下面突起,侧脉两面不明显;叶柄长约 2 毫米。花单生叶腋;花梗纤细,长 6—12 毫米,被腺体;花萼长约 3 毫米,裂片卵状披针形,两面密被细腺体;花冠黄色,分裂近达基部,裂片长椭圆形,长约 5 毫米,宽 1.5 毫米,具棕色腺点;花丝基部合生成浅环,分离部分长约 1 毫米;花药长约 3 毫米,顶孔开



1—2. 条叶香草 *Lysimachia vittiformis* Chen et C. M. Hu: 1. 植株, 2. 花冠展开示雄蕊。3—4. 海桐
状香草 *Lysimachia pittosporoides* C.Y. Wu: 3. 果枝, 4. 蒴果。(邓晶发绘)