

裂;花柱略长于雄蕊。蒴果球形,直径约3毫米。花期5—6月。

产于广西西部。生于石灰岩上。模式标本采自田阳。

本种是香草亚属中唯一花冠具有腺点的种,同时叶密且小,极易识别。

21. 富宁香草(植物分类学报)

Lysimachia fooningensis C.Y. Wu, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1:36. 1965; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. 17: 27. 1979. — *Ardisia esquirolii* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 12:186. 1913. — *Lysimachia lancifolia* auct. non Craib: Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 16:72. 1928; p.p. quoad specim. Cavalerie 4358. — *Lysimachia esquirolii* Lauener in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 35:226. 1977.

株高20—50厘米,干后芳香。茎单生或2—3条簇生,直立,坚硬,木质,近圆柱形或上部微具棱,幼时密被无柄腺体,上半部具向顶端稍密聚的叶和花,下部仅具叶痕或少数鳞片状叶。叶互生,椭圆状披针形至狭披针形,长3—11厘米,宽0.7—2.8厘米,先端渐尖或锐尖,基部渐狭,边缘极狭内卷,干时坚纸质,有极密网脉,上面极疏、下面较密被无柄腺体;叶柄长0.5—1.5厘米。花单朵或两朵生于叶腋,很少3—4朵生于叶腋的短枝端;花梗纤细,长1.5—3(5)厘米;花萼长约2.5毫米,几自基部分裂成三角形的裂片;花冠黄色,长9—11毫米,分裂近达基部,裂片线形,宽2—3毫米,先端钝;花丝基部与花冠合生约0.5毫米,分离部分明显,长1—1.5毫米;花药长4—5毫米,基部宽约1毫米,先端钝,顶孔开裂。蒴果近球形,白垩色,直径约4毫米,比萼片长,狭瓣开裂。

产于云南东南部、贵州西南部和广西北部。生于林下和山谷中,海拔800—1300米。模式标本采自云南富宁。

22. 兴义香草(新拟) 小花星宿菜(拉汉种子植物名称)

Lysimachia millietii (Lévl.) Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7:731. 1936; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 18:232. 1937. — *Lysimachia lancifolia* acut. non Craib: Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 16: 72. 1928; p.p. quoad specim. Cavalerie 7757. — *Andrachne millietii* Lévl. in Bull. Acad. Geogr. Bot. 24:146. 1914.

株高40—60厘米,干后稍有香气。茎基部常分枝,成簇生状,下部近圆柱形,上部具棱。叶互生,披针形,长3—4.5厘米,宽0.5—1.5厘米,先端锐尖或稍渐尖,基部楔形,边缘极狭内卷,厚纸质,上面深绿色,下面粉绿色,中肋在上面凹陷,在下面突起,侧脉2—3对,在下面稍明显,网脉两面不显;叶柄长3—5毫米。花单出腋生;花梗纤细,长2.5—3厘米;花萼长约3毫米,分裂近达基部,裂片披针形,背面中肋稍隆起;花冠黄色,长约6毫米,分裂近达基部,裂片狭长圆形,宽约2毫米,先端稍锐尖;花丝分离部分长约0.5毫米;花药长3.8毫米,基部微呈心形,宽约0.8毫米,顶孔开裂。蒴果未见。花期6月。

产于贵州西部。生于山坡林缘。模式标本采自兴义。

以上形态特征系根据英国皇家爱丁堡植物园所藏的模式标本描述。本种体态与富宁