

产于四川东部和湖北西部。生于山地林下及草丛中,海拔 1100—1400 米。模式标本采自湖北巴东。

本种体态和叶形均与蔓延香草 *L. trichopoda* Franch. 极近似,唯植株干后芳香,花较小,雄蕊长仅 2.5—3 毫米,可以区别。

31. 短蕊香草(植物分类学报)

Lysimachia brachyandra Chen et C.M. Hu in Act. Phytotax. Sin. 17:30.1979.

株高约 30 厘米,干后无香气。茎直立或基部稍倾卧,通常有分枝,基部直径约 3 毫米,稍具棱,上部明显四棱形,棱边呈狭翅状。叶互生,近等大,披针形,长 4—7 厘米,宽 6—15 毫米,先端渐尖,基部渐狭,边缘具微细的乳头状突起而稍粗糙,干时膜质,上面疏被小刚毛或变无毛,两面均被无柄小腺体,侧脉 4—5 对,网脉纤细,不明显;叶柄长 8—25 毫米,有极狭的草质边缘。花单出腋生;花梗纤细,长 2—2.5 厘米,果时长达 3 厘米;花萼长约 4 毫米,分裂近达基部,裂片自狭卵形的基部渐尖成钻形;花冠黄色,初开时比花萼短,盛开时稍长于花萼,深裂近达基部,裂片广椭圆形,长 3—5 毫米,先端钝;花丝基部连合成高 0.5 毫米的环并与花冠基部合生,分离部分极短,约与花药的心形基部等长;花药长约 1.75 毫米,先端钝,顶孔开裂;花粉粒具 3 孔沟,近长球形 $[(16-17) \times (14-15)]$ 微米,表面微皱;子房卵珠形,花柱长 4 毫米。蒴果近球形,带白色,直径约 3 毫米,约与宿存萼片等长。花期 6—7 月。

产于贵州西南部。生于山坡草地及林下,海拔 1200 米。模式标本采自兴义。

32. 大花香草 大花排草(拉汉种子植物名称)

Lysimachia grandiflora (Franch.) Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 16: 71. 1928; Chen et C.M. Hu in Act. Phytotax. Sin. 17: 45. 1979. — *Lysimachia ramosa* Wall. var. *grandiflora* Franch. in Journ Morot. Bot. 9: 464. 1895.

株高 18—35 厘米,干后无香气。茎直立,具棱,上部棱边呈狭翅状。叶互生,卵状披针形,长 4—7.5 厘米,宽 1.5—2.5 厘米,先端渐尖,基部楔形至近圆形,上面疏被小刚毛,下面淡粉绿色,无毛,侧脉 4—5 对;叶柄长(1—) 1.5—2.5 厘米。花单生于茎上部叶腋;花梗纤细,长 2.5—4 厘米,无毛,顶端稍膨大;花萼长约 3.5 毫米,基部合生约 1 毫米,裂片扁圆形,宽约 2.5 毫米,先端具骤尖头,边缘互相覆盖,背面具 6—7 纤细纵脉;花冠长 10—15 毫米,合生部分长约 3.5 毫米,裂片长圆形,宽约 5.5 毫米,先端钝;花丝长约 1 毫米;花药长 4.2—4.4 毫米,基部宽 1.4 毫米,顶孔开裂。蒴果近球形,直径 5.5—6 毫米,灰白色。

产于云南东北部。生于林下。模式标本采自盐津成凤山。

经检查模式标本,本种是一成立的好种,其与川香草 *L. wilsonii* Hemsl. 的区别在于花单生于叶腋,不组成总状花序;花较大,花药孔裂,蒴果灰白色,具多数纵条纹,与多枝香草 *L. laxa* Baudo 显著不同。

33. 多枝香草(植物分类学报) 多枝排草(拉汉种子植物名称)