

茎草质,有狭翅,拱曲而后匍匐或鞭状伸长,叶对生。花黄色,单出或双出腋生;花药以顶端开张的侧缝开裂。蒴果脆壳质,瓣裂。

本组有下列3种。

35. 思茅香草(植物分类学报) 思茅过路黄(拉汉种子植物名称)

Lysimachia englerii R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22** (IV-237): 265. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 75. 1928; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 30. 1979.

35a. 思茅香草(原变种) 图版 11:1—3

var. **englerii**

茎单生或2—3条簇生,下部近直立,近基部常有分枝,上部鞭状伸长,弧曲,有时着地生根,长50—180厘米,四棱形,棱边有狭翅,翅宽可达1.5毫米。叶交互对生,近于无柄或具长达8毫米的短柄,叶片椭圆形至广卵形,长4—10厘米,宽2.5—5厘米,先端锐尖,基部近圆形或阔楔形,边缘微呈波状,具极细密的乳头状突起,上面绿色,无毛或疏被极短的小刚毛,下面淡绿色,密被无柄小腺体,侧脉5—7对,与中肋均在上部凹陷,下面突起。花1—2(4)朵生于叶腋;花梗纤细,长2—3.5厘米;花萼长6毫米,分裂近达基部,裂片自卵圆形的基部渐尖成钻形,基部宽约1.75毫米,背面中脉稍隆起;花冠黄色,长8毫米,深裂近达基部,裂片阔倒卵形,宽约5毫米,先端钝;花丝基部连合成高约0.5毫米的环并与花冠基部合生,分离部分极短,约与花冠的心形基部等长;花药长2.5毫米,先端钝,近纵裂;花粉粒具3孔沟,长球形[(22—26)×(16—18.5)微米],表面具小乳突状雕纹;子房卵珠形;花柱长约4.7毫米。蒴果近球形,褐色,直径约4毫米,比萼片短。花期4—5月,果期7—8月。

产于云南西部和西南部、四川西南部。生于山坡灌丛中,海拔2200—2400米。模式标本采自云南思茅。

35b. 小思茅香草(变种)

var. **glabra** (Bonati) Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 30. 1979. — *Lysimachia plicata* Franch. ex R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22** (IV-237): 265. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 76. 1928. — *Lysimachia deltoidea* Wight var. *glabra* Bonati in Bull. Soc. Bot. France **56**: 466. 1909.

茎近直立,高仅15—30厘米,先端不伸长成鞭状。叶较小,长2—4厘米。

产于云南(漾濞、宾川)。生于山坡林缘和路边,海拔2400米。模式标本采自宾川。

36. 心叶香草(植物分类学报)

Lysimachia cordifolia Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 76. 1928; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 31. 1979.

茎单生或2—3条簇生,自基部直立,上部弧曲,鞭状伸长,长30—100厘米,明显四棱形,棱边具狭翅,下部节间短,约与叶等长,上部节间渐疏离,长可达7厘米。叶交互对生,