

产于四川(南川县)。生于林下,海拔 1600—1850 米。模式标本采自金佛山。

系 3.耳柄系——Ser. *Elatae* Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 102. 1928; Chen et C.M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 33. 1979.

花单生于茎和枝的上部叶腋,有时稍密聚成总状花序状,稀为伞形花序;花丝下部合生成筒。茎直立。叶对生,稀轮生,披针形至狭披针形;叶柄基部通常明显扩大成耳状。植物体无腺点或具透明腺点,极少花冠具褐色腺条。

本系有下列 4 种。

50. 贯叶过路黄(植物分类学报) 图版 15:1

Lysimachia perfoliata Hand.-Mazz. in Osterr. Bot. Zeitsch. **88**: 305. 1939; Chen et C.M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 33. 1979.

茎直立,通常 2 至数条簇生,高 20—40 厘米,圆柱形,基部常带枣红色,直径达 3 毫米,中部以上分枝,幼时被小糙伏毛。叶对生,披针形,有时在茎上部成卵形,长 2—7.5 厘米,宽 6—20 毫米,先端长渐尖,下部收缩,至基部再扩大成琴状并与对侧叶片的基部合生成穿茎叶,两面均被小糙伏毛,密布透明腺点,背面沿中肋被多细胞柔毛,侧脉 3—4 对,在下面稍隆起。花单生于茎上部和枝端叶腋,略呈总状花序状;花梗密被小糙伏毛,最下方的长可达 2.5 厘米,向上渐次缩短,以至长不及 1 厘米,果时下弯;花萼长约 6 毫米,果时长可达 1 厘米,分裂近达基部,裂片披针形,先端渐尖成钻形,背面密被小糙伏毛及透明腺点;花冠黄色,稍伸出花萼,基部合生部分长 1.5—2 毫米,裂片阔卵形,先端圆钝;花丝长 6—7 毫米,基部合生成高 2—2.5 的筒;花药线形;花柱约与雄蕊等长。蒴果褐色,直径 4—5 毫米,上部有稀疏糙伏毛。

产于江西北部 and 安徽南部。生于山谷林下,海拔 850—1100 米。模式标本采自安徽潜山县。

51. 山萝过路黄(植物分类学报) 女娄菜状过路黄(拉汉种子植物名称)

Lysimachia melampyroides R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV—237): 284. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 102. 1928; Chen et C.M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 33. 1979.

51a. 山萝过路黄(原变种) 图版 15:2—4

var. ***melampyroides***

茎通常 2 至多条簇生,直立或上升,高 15—50 厘米,圆柱形,密被褐色小糙伏毛,通常有分枝。叶对生,茎下部的 2—3 对较小,卵形至卵状披针形,具基部扩展成耳状的柄,茎上部叶卵状披针形至狭披针形,长 3—9 厘米,宽 5—25 毫米,先端渐尖或长渐尖,极少锐尖或稍钝,基部楔形,上面密被小糙伏毛,老时近于无毛,下面沿叶脉被毛,其余部分近于无毛,两面均密布粒状透明腺点,侧脉 4—5 对,网脉不明显;叶柄长 2—10 毫米,密被褐



1. 贯叶过路黄 *Lysimachia perfoliata* Hand.-Mazz. 植株。2—4. 山萝过路黄 *Lysimachia melampyroides* R. Knuth: 2. 植株, 3. 花冠展开示雄蕊, 4. 蒴果。5. 抱茎山萝过路黄 *Lysimachia melampyroides* var. *amplexicaulis* Chen et C. M. Hu 植株上部。(邓晶发绘)