

本种叶的形状、质地以及毛被均与尖瓣过路黄 *L. erosipetala* Chen et C. M. Hu 近似, 惟花在茎端和枝端成缩短的亚头状总状花序, 萼片、花冠具透明腺点而不同。与叶苞过路黄 *L. hemsleyi* Franch. 的区别亦在于花序呈亚头状, 叶较薄, 基部圆形, 毛被较疏。

63. 腾冲过路黄(拉汉种子植物名称)

Lysimachia tengyuehensis Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 82. 1928; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin **17**: 35. 1979.

茎自匍匐生根的基部上升, 长 15—50 厘米, 近圆柱形, 基部以上稍增粗, 直径 1.5—2 毫米, 被淡黄色长达 1 毫米的多细胞柔毛, 主茎的节间与叶近等长或为叶长的 2—3 倍, 分枝的节间疏离, 长可达 9 厘米。叶交互对生, 很少 3 枚轮生或在茎上部互生, 茎端的 2 对密聚, 常较茎下部的稍大, 叶片卵圆形, 长 11—37 毫米, 宽 7—25 毫米, 先端锐尖, 基部阔楔形或近圆形, 上面深绿色, 下面较淡, 略带粉绿色, 两面均被淡黄色具节糙伏毛, 下面较密, 侧脉 2—3 对, 在下面稍明显; 叶柄长 2—10 毫米。花通常 2—3 朵生于茎端叶腋, 密聚成头状花序状或稍疏离; 花梗长 3—8 毫米, 密被柔毛; 花萼长 7—10 毫米, 裂片近分离, 线状披针形, 宽 1.5—2 毫米, 背面被淡黄褐色多细胞柔毛, 两面均有无色腺点; 花冠黄色, 内面基部橙红色, 长 13—15 毫米, 基部合生部分长 3—4 毫米, 裂片阔披针形, 宽 5—6 毫米, 先端锐尖; 花丝基部合生成高约 2 毫米的筒, 分离部分长约 3 毫米; 花药长圆形, 长约 2 毫米; 子房密被多细胞柔毛, 花柱长达 8 毫米, 被疏毛。蒴果近球形, 直径约 4 毫米。花期 5—7 月; 果期 6—8 月。

产于云南西南部。生于溪旁灌丛中及稻田边, 垂直分布可达海拔 2400 米。模式标本采自腾冲。

64. 泰国过路黄(新拟)

Lysimachia siamensis Bonati in Bull. Soc. Bot. Geneve 2 ser. **5**: 304. 1913, f. 6². — *Lysimachia debilis* auct non Wall.: Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 92. 1928, p. p. quoad syn. *L. siamensis* Bonati. — *Lysimachia japonica* auct. non Thunb.: Bonati in Fl. Gen. Indo-Ch. **3**: 579. 1930; Benth. in Fl. Malesiana **6**(2): 182. 1962, p. p. quoad syn. *L. siamensis* Bonati

茎自倾卧的基部上升, 长 15—35 厘米, 被淡褐色多细胞柔毛, 上部常有分枝。叶互生, 茎端 2 对稍密聚, 叶片卵圆形或椭圆状卵形, 长 1.5—4 厘米, 宽 1—2.2 厘米, 先端锐尖, 基部阔楔形, 下延, 两面均被多细胞柔毛; 叶柄长通常为叶片的 $1/3$ — $1/2$, 具狭翅, 被多细胞柔毛。花 2—4 朵生于茎端和枝端, 密聚呈头状花序状或稍疏离; 花梗长 3—8 毫米, 密被褐色柔毛; 花萼长 6—7 毫米, 分裂近达基部, 裂片披针形, 背面被多细胞柔毛; 花冠黄色, 长 11—14 毫米, 基部合生部分长约 2 毫米, 裂片椭圆形或椭圆状披针形, 无腺点, 先端锐尖; 花丝基部合生成高约 2.5 毫米的筒, 分离部分长 2—3 毫米; 花药长 1.6—1.8 毫米; 子房顶端被毛, 花柱长约 7 毫米。蒴果球形, 比宿存花萼短。花期 4—5 月。