

有少数分枝;枝纤细,仅顶端具叶。叶对生,茎端的3—4对密聚,近轮生状,放射状展开,基部的1—2对较小,狭椭圆形,长1.8—3厘米,宽9—12毫米,先端锐尖,基部渐狭,具短柄;叶柄基部稍作耳状扩展,半抱茎状。上部茎叶狭披针形,长3.5—7厘米,宽4—9毫米,先端长渐尖,有时向一侧稍弯,基部渐狭,近于无柄,上面疏被柔毛,下面无毛或仅沿中脉被疏毛、两面均密生粒状无色腺点,侧脉纤细,不明显。花4至多朵,在茎端和枝端密聚成头状花序状;苞片卵状披针形至披针形,比花萼长,边缘具铁锈色缘毛;花梗长0.5—2.5毫米;花萼长约8毫米,分裂近达基部,裂片钻形,无毛,两面密生粒状无色腺点;花冠黄色,长约12毫米,基部合生约4毫米,裂片椭圆状倒卵形,宽约4.5毫米,先端锐尖;花丝基部合生成高约3毫米的筒,分离部分长2—5毫米;花药腺形,长达2毫米;花粉粒近球形 $[(34-36) \times (31-32)]$ 微米,表面具网状纹饰;子房无毛,花柱长达10.5毫米。花期4—5月。

产于湖南西南部。生于林缘和灌丛中。模式标本采自黔阳。

系6.伞叶系——Ser. Paridiformes Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 36. 1979.

花在茎端组成伞形花序;花丝下部合生成筒。茎直立或上升。叶4至多枚轮生茎端,下部叶退化呈鳞片状。植物体有极稀疏的黑色腺条。

本系有下列2种和1变种。

69. **落地梅**(植物名实图考) 重楼排草(拉汉种子植物名称), 四块瓦、四叶黄、四儿风(四川)

Lysimachia paridiformis Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris **1**: 433. 1884, includ. var. *elliptica*; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 55. 1889, p. p. excl. pl. Fordiana; Oliv. in Hook. Icon. Pl. **20**: t. 1982. 1891; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22** (IV-237): 280. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 86. 1928; 中国高等植物图鉴**3**: 273. 图4499. 1974; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 36. 1979.——*Lysimachia bodinieri* Petitm. in Monde des Plantes **9**: 30. 1907.

69a. **落地梅**(原变种) 图版 20: 1—3

var. **paridiformis**

根茎粗短或成块状;根簇生,纤维状,直径约1毫米,密被黄褐色绒毛。茎通常2至数条簇生,直立,高10—45厘米,无毛,不分枝,节部稍膨大。叶4—6片在茎端轮生,极少出现第二轮叶,下部叶退化呈鳞片状,叶片倒卵形以至椭圆形,长5—17厘米,宽3—10厘米,先端短渐尖,基部楔形,无柄或近于无柄,干时坚纸质,无毛,两面散生黑色腺条,有时腺条颜色不显现,仅见条状隆起,侧脉4—5对,在下面稍隆起,网脉隐蔽。花集生茎端成伞形