

80. 浙江过路黄(植物分类学报) 图版 23: 3—7

Lysimachia chekiangensis C. C. Wu in Act. Phytotax. Sin. **9**: 313. 1964; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 38. 1979.

茎匍匐,长可达30厘米,下部节上生根,与叶柄、花梗及花萼一同密被铁锈色多细胞柔毛及少数无柄腺体;分枝上升,长达20厘米,节间长1—4.5厘米。叶对生,阔卵形,稀近圆形,长5—30毫米,宽3—27毫米,先端钝或近圆形,基部截形,有时楔形,质地稍厚,上面深绿而稍带紫色,下面淡灰色,密被多细胞柔毛,有透明腺点,中肋稍宽,在下面微隆起,侧脉少数,不明显;叶柄比叶片短一半以至近等长。花单生于茎端叶腋;花梗长3—4毫米;花萼分裂近达基部,裂片披针形,长4—6毫米,先端渐尖;花冠黄色,阔漏斗形,直径约12毫米,长约8毫米,基部合生部分长约2毫米,裂片倒卵形或阔椭圆形,宽4—5毫米,先端圆钝,具透明腺点;雄蕊长约6毫米,花丝下部合生成高约2毫米的筒;花药卵状长圆形,长约1.5毫米;花柱长4.5毫米,基部密被多细胞柔毛。蒴果球形,直径3—4毫米,被毛。花期5—6月;果期6—7月。

产于浙江西南部。生于山坡阴处草丛中和灌丛中。模式标本采自龙泉县。

81. 巴东过路黄(中国高等植物图鉴)

Lysimachia patungensis Hand.-Mazz. in Not. Roy. Gard. Edinb. **16**: 97. 1928; Migo in Bull. Shanghai Sci. Inst. **14**: 71. 1944; 中国高等植物图鉴 **3**: 276, 图 4505. 1974; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 38. 1979.

81a. 巴东过路黄(原变型) 图版 24: 1—5

f. *patungensis*

茎纤细,匍匐伸长,节上生根,长10—40厘米,密被铁锈色多细胞柔毛;分枝上升,长3—10厘米,节间长1—3.5厘米。叶对生,茎端的2对(其中1对常缩小成苞片状)密聚,呈轮生状,叶片阔卵形或近圆形,极少近椭圆形,长1.3—3.8厘米,宽8—30毫米,先端钝圆、圆形或有时微凹,基部宽截形,稀为楔形,草质而稍厚,上面绿色,下面粉绿色,两面密布具节糙伏毛,边缘透光可见透明粗腺条,中肋稍宽,在下面微隆起,侧脉不明显;叶柄长约为叶片的一半或与叶片近等长,密被柔毛。花2—4朵集生于茎和枝的顶端,无苞片;花梗长6—25毫米,密被铁锈色柔毛;花萼长6—7毫米,分裂近达基部,裂片披针形,宽约1.5毫米,顶端稍钝,具极狭的膜质边缘,背面被疏柔毛;花冠黄色,内面基部橙红色,长12—14毫米,基部合生部分长2—3毫米,裂片长圆形,宽3—5毫米,先端圆钝,有少数透明粗腺条(干后有时呈淡褐色);花丝下部合生成高2—3毫米的筒,分离部分长4—6毫米;花药卵状长圆形,长约1.5毫米;花粉粒具3孔沟,近球形 $[(28-30) \times (25-27)]$ 微米,表面具网状纹饰;子房上部被毛,花柱长达6毫米。蒴果球形,直径4—5毫米。花期5—6月;果期7—8月。

产于湖北、湖南、广东、江西、安徽、浙江、福建。生于山谷溪边和林下,垂直分布上限



1—2.点腺过路黄 *Lysimachia hemsleyana* Maxim.: 1. 植株, 2. 花冠展开示雄蕊。3—7. 浙江过路黄 *Lysimachia chekiangensis* C. C. Wu: 3. 植株, 4. 花萼, 5. 花冠的一部分, 6. 雄蕊, 7. 雌蕊。(邓晶发绘)