

过路黄(拉汉种子植物名称)

**Lysimachia drymarifolia** Franch. in Journ. Bot. Morot **9**: 462. 1895; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 264. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 99. 1928; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 40. 1979. excl. syn. *L. fargesii* Franch. — *Lysimachia drymarifolia* var. *grandiflora* Bonati in Bull. Bot. Geneve 2. ser. **5**: 303. 1913. quoad pl. Yunnanensem.

茎纤细,常自基部分枝,下部匍匐,上部及分枝略上升,长7—35厘米,密被铁锈色多细胞柔毛。叶对生,阔卵形、近圆形以至肾圆形,长1—2.5厘米,宽8—22毫米,先端钝或圆形,基部圆形至浅心形,两面密布黑色短腺条,被稀疏或较密的具节糙伏毛,中肋在下面隆起,侧脉纤细,不明显;叶柄通常长为叶片的1/2—2/3,密被铁锈色柔毛。花单生叶腋,花梗长1—4厘米,通常比叶长1—2倍,被锈色柔毛和褐色腺体,有时近于无毛;花萼长5—6毫米,分裂近达基部,裂片长圆状披针形,先端稍钝,具极狭的膜质边缘,背面被疏柔毛,近基部中肋稍隆起;花冠黄色,长10—12毫米,基部合生部分长1.5—2毫米,裂片卵形或卵状长圆形,宽4—6毫米,先端钝,散生黑色短腺条;花丝下部合生成高1.5—2毫米的短筒,分离部分长2—3毫米;花药卵形,长约1毫米;花粉粒具3孔沟,近长球形( $25-31 \times 21-24$ 微米),表面具网状纹饰;子房光滑或有时被毛,花柱长4—5毫米。花期5—6月。

产于云南北部和四川西南部。生于溪边、山谷林下湿润处,海拔1400—3500米。模式标本采自云南北部。

鞭绣球一名出自《植物名实图考》,但其所指植物是否即为本属植物尚有疑问,故暂不列为正名。

#### 90. 广西过路黄(拉汉种子植物名称) 四叶一枝花(广西)

**Lysimachia alfredii** Hance in Journ. Bot. London **15**: 356. 1877; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 47. 1889; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 281. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 101. 1928; Chien in Contrib. Biol. Lab. Sci. Soc. China **10**: 28. 1933; Migo in Bull. Shanghai Sci. Inst. **14**: 68. 1944; 中国高等植物图鉴 **3**: 277. 图4507. 1974; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 40. 1979.

#### 90a. 广西过路黄(原变种)

##### var. *alfredii*

茎簇生,直立或有时基部倾卧生根,高10—30(45)厘米,单一或近基部有分枝,被褐色多细胞柔毛。叶对生,茎下部的较小,常成圆形,上部茎叶较大,茎端的2对间距很短,密聚成轮生状,叶片卵形至卵状披针形,长3.5—11厘米,宽1—5.5厘米,先端锐尖或钝,基部楔形或近圆形,边缘具缘毛,两面均被糙伏毛,极密或有时稀疏,密布黑色腺条和腺