

点,侧脉纤细,不明显;叶柄长1—2.5厘米,密被柔毛。总状花序顶生,缩短成近头状;花序轴极短或长达1厘米;苞片阔椭圆形或阔倒卵形,长6—25毫米,宽5—14毫米,先端圆钝,基部渐狭,密被糙伏毛;花梗长2—3毫米,密被柔毛;花萼长6—8毫米,分裂近达基部,裂片狭披针形,边缘膜质,背面被毛,有黑色腺条;花冠黄色,长10—15毫米,基部合生部分长3—5毫米,裂片披针形,先端钝或锐尖,密布黑色腺条;花丝下部合生成高2.5—3.5毫米的筒,分离部分长3—5毫米;花药长圆形,长约1.5毫米;花粉粒具3孔沟,近球形 $[(27-32) \times (26-29.5)]$ 微米,表面具网状纹饰。蒴果近球形,褐色,直径4—5毫米。花期4—5月;果期6—8月。

产于贵州、广西、广东、湖南和江西南部、福建西南部。生于山谷溪边、沟旁湿地、林下和灌丛中,海拔220—900米。模式标本采自福建。

90b. 小广西过路黄(变种)

var. *chrysosplenioides* (Hand.-Mazz.) Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 40. 1979. — *Lysimachia chrysosplenioides* Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien. Math.-Nat. **62**: 24. 1925.

植株较矮小,高6—12厘米。茎基部倾卧,节上生根,自基部分枝。叶卵圆形,有时近圆形,长2—5厘米,宽1.3—3.5厘米,幼时带红色。花期5月。

产于贵州、广西。生于山谷疏林下。模式标本采自贵州东南部。

系10. 金爪儿系——Ser. Grammicæ Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 102. 1928; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 40. 1979.

花单出腋生;花丝下部合生成宽而短的环。茎近直立。叶互生。植物体密生黑色腺条。本系仅有下列1种。

91. 金爪儿(江苏南部种子植物手册) 图版 26: 1—4

Lysimachia grammica Hance in Ann. Sci. Nat. Paris 5. ser. **5**: 225. 1866, et in Journ. Bot. London **15**: 357. 1877; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 52. 1889; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 263. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 102. 1928; Chien in Contrib. Biol. Lab. Sci. Soc. China **10**: 40. 1935; Migo in Bull. Shanghai Sci. Inst. **14**: 69. 1944; 江苏南部种子植物手册567. 1959; 中国高等植物图鉴 **3**: 278. 图4509. 1974; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17**: 40. 1979. — *Lysimachia nigrolineata* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **29**: 315. 1893.

茎簇生,膝曲直立,高13—35厘米,圆柱形,基部直径约1毫米,向上稍增粗,密被多细胞柔毛,有黑色腺条,通常多分枝。叶在茎下部对生,在上部互生,卵形至三角状卵形,长1.3—3.5厘米,宽8—25毫米,先端锐尖或稍钝,基部截形,骤然收缩下延,两面均被多