毫米;花梗长约 3 毫米,果时长达 5 毫米;花萼长约 1.7 毫米,分裂近达基部,裂片卵状椭圆形,先端稍锐尖,边缘膜质,具腺状缘毛,背面和顶端有红色腺条;花冠白色,长约 4 毫米,基部合生部分长约 1 毫米,裂片卵形或卵状椭圆形,先端钝,有红色腺点;雄蕊比花冠短,花丝贴生至花冠裂片的基部,分离部分长约0.5毫米;花药卵圆形,长约 0.5 毫米;子房卵珠形,花柱短,长约 2 毫米。蒴果球形,直径 2—3 毫米。　花期 5—6 月;果期 6—8 月。

产于浙江西北部。生于山谷溪旁和山坡林缘,海拔 600—1000 米。模式标本采自天目山。

103. **大叶珍珠菜**(植物分类学报)

Lysimachia stigmatosa Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17:** 41. 1979.

多年生草本,无横走的根状茎。茎直立,圆柱形,高达80厘米,基部直径达 5 毫米,无毛,有极稀疏的紫褐色腺条,上部及花序轴密被黄褐色无柄腺体。叶互生,狭椭圆形,长 11—16 厘米,宽 4—5 厘米,先端锐尖,基部楔状渐狭,下延,干时膜质,上面绿色,下面淡绿色,无毛,沿边缘有黑色细腺条,侧脉9—11对,网脉不显著;叶柄长 1.5—2.5 厘米,具狭翅。总状花序顶生,长 30—35 厘米;花梗长达 1 厘米;苞片钻形,长 2—3 毫米,有黑色腺条;花萼长约 2 毫米,分裂近达基部,裂片椭圆形,先端钝,背面有 2 条胼胝状粗腺条,边缘及顶部均膜质,有腺状缘毛;花冠白色,长约 4 毫米,基部合生部分长约 1 毫米,裂片椭圆形,宽约 1.6 毫米,先端圆形;雄蕊比花冠短,花丝贴生至花冠裂片的基部,分离部分长约 1 毫米;花药卵圆形,长约 1 毫米;子房无毛,花柱长约 1.8 毫米,柱头明显膨大。　花期 5 月。

产于江西东北部和安徽南部。生于山地杂木林下和路边潮湿地。模式标本采自江西景德镇。

组3. 合萼组——Sect. Apochoris (Duby) Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16:** 110. 1928; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17:** 41. 1979.——*Apochoris* Duby in DC. Prodr. **8:** 67. 1844. pro gen.

总状花序顶生;苞片钻形;花萼下部合生达全长的 1/3 或近 1/2;花冠白色,分裂近达基部;花丝贴生于花冠裂片的近中部;花柱长约达花冠中部。叶互生。

本组仅有 1 种。

104. **狭叶珍珠菜**(拉汉种子植物名称)

Lysimachia pentapetala Bunge in Mem. Acad. Sci. St. Petersb. **2:** 127. 1835; Klatt in Abh. Naturw. Ver. Hamb. 4, **4:** 15. t. 6. 1866; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26:** 55. 1889; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22** (IV-237): 302. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16:** 110. 1928; 中国高等植物图鉴 **3:** 282. 图 4518. 1974; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. **17:** 41. 1979; 东北