

全草药用,有消肿止痛之效。广西民间用以治跌打损伤、疗毒等。

121. 短花珍珠菜(新拟)

Lysimachia breviflora C. M. Hu in Act. Bot. Austro sinica 2:201. 1986.

多年生草本。茎高达1米,钝四棱形,上部分枝,梢端和嫩枝密被褐色无柄腺体。叶互生,披针形,长5—10厘米,宽8—20毫米,先端锐尖或稍渐尖,基部楔状渐狭,边缘微呈皱波状,上面深绿色,下面较淡,无毛,沿边缘有红褐色或黑色腺点,有时腺点极密,连结成条,侧脉每边4—5条,网脉在下面稍明显;叶柄长1.5—3.5厘米,具极狭的草质边缘。总状花序生于茎端和枝端,长8—13厘米,疏花;花梗长5—7.5毫米,微具棱,果时长可达1厘米;苞片钻形,稍短于花梗;花萼长4—4.5毫米,分裂近达基部,裂片披针形,先端渐尖,边缘膜质,背面有4列褐色纵腺条;花冠淡紫红色,短于花萼,长约3.5毫米,合生部分长1.5毫米,裂片线状长圆形,宽约0.8毫米,先端圆钝,无腺点,裂片间弯缺钝圆;花丝贴生于花冠裂片基部,长约3.5毫米,明显伸出花冠外;花药卵圆形,长约0.5毫米;子房无毛,花柱长达4毫米。蒴果褐色,稍短于宿存花萼。花期6月。

产于云南西部。生于山坡草地,海拔1700—1800米。模式标本采自福贡。

122. 大花珍珠菜(植物分类学报)

Lysimachia violascens Franch. in Journ. Bot. Morot 9: 459. 1895; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. 22 (IV-237): 297. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 16: 115. 1928, et Symb. Sin. 7: 734. 1936; Chen et C. M. Hu in Act. Phytotax. Sin. 17: 43. 1979.

122a. 大花珍珠菜(原变种)

var. **violascens**

多年生草本,全体无毛。茎单生或2—3条簇生,直立,高30—90厘米,下部近圆柱形,上部微具棱,初被褐色无柄腺体,通常不分枝。叶互生,在茎下部有时近对生,叶片披针形至狭披针形,长3.5—10厘米,宽0.6—2.0厘米,先端渐尖,基部渐狭,无柄或近于无柄,边缘微呈皱波状,上面绿色,下面粉绿色,两面均有不规则的暗紫色或黑色腺点或腺条。总状花序顶生,长4—20厘米;苞片线形,约与花梗等长;花梗长5—7(13)毫米,向上伸展;花萼长5—6毫米,分裂近达基部,顶端锐尖,边缘膜质,背面有4—6条褐色粗腺条;花冠淡红色,钟状,长8—12毫米,基部合生部分长4—5毫米,裂片倒卵形,先端圆钝,裂片间弯缺窄,成锐角;雄蕊比花冠短近1/3,花丝贴生于花冠裂片的基部,分离部分长约4毫米;花药椭圆形,长1毫米;花粉粒具3孔沟,长球形[(25.5—28.5)×(17.5—21)微米],表面具网状纹饰;子房无毛,花柱长约6毫米。蒴果球形,直径5—6毫米。花期7月。

产于云南西北部(鹤庆、洱源)和四川西南部(盐源)。生于松栎林下和林缘草地,海拔2500—3200米。模式标本采自洱源黑山门。

122b. 丽江珍珠菜(变种) 图版 32: 1—5