

f. **coerulea** (Schreb.) Baumg. Fl. Lips. 111.1790. — *Androsace coerulea* Schreber, Spicil. Fl. Lips. 5. 1771.

花冠浅蓝色。

产地与原变型相同,并常与原变型混生一处。

2. 仙客来族——Trib. *Cyclameneae* Pax

Pax in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 2:115. 1889.

多年生草本,具球状块茎;叶基生;花冠具短筒,裂片在花蕾中旋转状排列,开放后剧烈反卷;子房上位;蒴果瓣裂。

5. 仙客来属——*Cyclamen* L.

L. Sp. Pl. 145. 1753; Duby in DC. Prodr. 8: 56. 1844; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 634. 1873; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. 22(IV-237):246. 1905.

多年生草本,具扁球形块茎。叶自块茎顶端丛生,具长柄,叶片卵心形或肾形,全缘或有深波状齿。花萼1至多数;花单生于花萼顶端,下垂;花萼5裂,裂片卵形或卵状披针形,宿存;花冠紫色、红色或白色,筒部短,近球形,喉部增厚,裂片5,比筒部长3—5倍,在花蕾中旋转状排列,开放后剧烈反卷;雄蕊5,着生于花冠筒基部,花丝极短,宽扁;花药箭形,渐尖;子房卵珠形,花柱丝状,多少伸出花冠筒外。蒴果球形或卵圆形,5瓣开裂达基部;果柄常卷缩成螺旋状。

本属约有20种,主产地中海区域。我国庭园栽培有1种。

1. 仙客来(拉汉种子植物名称) 兔耳花,兔子花,一品冠

Cyclamen persicum Mill. Gard. Dict. ed. 8, 1:n.3. 1768; Curtis, Bot. Mag. 2:t.44. 1788; Duby in DC. Prodr. 8: 57. 1844; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. 22(IV-237): 248. 1905.

多年生草本。块茎扁球形,直径通常4—5厘米,具木栓质的表皮,棕褐色,顶部稍扁平。叶和花萼同时自块茎顶部抽出;叶柄长5—18厘米;叶片心状卵圆形,直径3—14厘米,先端稍锐尖,边缘有细圆齿,质地稍厚,上面深绿色,常有浅色的斑纹。花萼高15—20厘米,果时不卷缩;花萼通常分裂达基部,裂片三角形或长圆状三角形,全缘;花冠白色或玫瑰红色,喉部深紫色,筒部近半球形,裂片长圆状披针形,稍锐尖,基部无耳,比筒部长3.5—5倍,剧烈反折。

原产希腊、叙利亚、黎巴嫩等地;现已广为栽培。花有白色、红色、紫色和重瓣等许多园艺品种;我国各地多栽培于温室中。