

3. 报春花族——Trib. Primuleae

Trib. *Androsaceae* Reichb. in Mössl. Handb. 1: 40. 1827.—Trib. *Primuleae* Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 629. 1873.

多年生、稀一年生草本，无茎或具分枝的短茎或根出条；叶常簇生成莲座状叶丛；花冠具明显的筒部，裂片在花蕾中覆瓦状排列；子房上位。蒴果顶端齿裂或瓣裂，稀盖裂。

6. 假报春属——*Cortusa* L.

L. Sp. Pl. 144. 1753; Duby in DC., Prodr. 8: 55. 1844; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 633. 1873; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. 22(IV-237): 220. 1905.

多年生草本，被多细胞柔毛。叶全部基生，具长柄，叶片心状圆形，7—9裂，裂片有牙齿或缺刻。花葶直立；伞形花序顶生，具苞片；花梗纤细，不等长；花萼5深裂，裂片披针形，宿存；花冠漏斗状钟形，红色或黄色，分裂达中部以下，裂片5，通常卵圆形，先端钝，筒部短，喉部无附属物；雄蕊5，着生于冠筒基部，花丝极短，基部膜质，连合成环；花药基部心形，向上渐狭，顶端具小尖头；子房卵珠形；胚珠多数，半倒生；花柱丝状，伸出冠筒外，柱头头状。蒴果顶端5瓣开裂；种子扁球形，具皱纹。

本属的模式种：假报春 *Cortusa matthioli* L.

本属约有10种，分布于欧洲中部至亚洲北部。

1. 假报春

Cortusa matthioli L. Sp. Pl. 144. 1753; Duby in DC., Prodr. 8: 55. 1844; Fed. in Kom., Fl. URSS. 18: 248. 1952; 东北草本植物志 7: 31. Pl. 15. 1981.

1a. 假报春(原亚种)

subsp. *matthioli*

多年生草本。株高20—25厘米，有时高达40厘米。叶基生，轮廓近圆形，长3.5—8厘米，宽4—8(9)厘米，基部深心形，边缘掌状浅裂，裂深不超过叶片的1/4，裂片三角状半圆形，边缘具不整齐的钝圆或稍锐尖牙齿，上面深绿色，被疏柔毛或近于无毛，下面淡灰色，被柔毛；叶柄长为叶片的2—3倍，被柔毛。花葶直立，通常高出叶丛1倍，被稀疏柔毛或近于无毛；伞形花序5—8(10)花；苞片狭楔形，顶端有缺刻状深齿；花梗纤细，不等长；花萼长4.5—5毫米，分裂略超过中部，裂片披针形，锐尖；花冠漏斗状钟形，紫红色，长8—10厘米，分裂略超过中部，裂片长圆形，先端钝；雄蕊着生于花冠基部，花药长达3.5毫米，纵裂，先端具小尖头；花柱长达8毫米，伸出花冠外。蒴果圆筒形，长于宿存花萼。花期5—7月；果期7—8月。

产于内蒙古(大兴安岭)和新疆(北部及天山)。生于云杉、落叶松林下腐殖质较多的