

阴处。分布于欧洲至西伯利亚。

1b. 河北假报春(东北草本植物志) 图版 36: 5—6

subsp. **pekinensis** (Al. Richt.) Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 351. 1939; 东北草本植物志 7: 31. 1981. — *Cortusa matthioli* L.f. *pekinensis* Al. Richt. in Tern. Fuz. 17:190. 1894. — *Cortusa pekinensis* (Al. Richt.) A. Los. in Act. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS. ser. 1, 3: 250. 1936; 东北植物检索表 275. 1959.

叶片轮廓肾状圆形或近圆形,掌状 7—11 裂,裂深达叶片的 1/3 或有时近达中部,裂片通常长圆形,边缘有不规整的粗牙齿,顶端 3 齿较深,常呈 3 浅裂状。

产于陕西、山西、河北。生于溪边、林缘和灌丛中。苏联远东地区和朝鲜北部有分布。模式标本采自河北。

7. 假婆婆纳属——*Stimpsonia* Wright ex A. Gray

Wright ex A. Gray in Mem. Amer. Acad. Sci. new ser. 6: 401. 1857-58, in adnot.; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 633. 1873; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. 22 (IV-237): 222. 1905.


一年生草本。茎直立或上升。基生叶具柄,茎叶互生,具短柄或无柄,边缘均有粗牙齿。花多数,单生于茎上部苞片状叶腋,具短梗;花萼 5 深裂,裂片线状长圆形,果时稍增大;花冠白色,高脚碟状,筒部略长于花萼,喉部不收缩,有细柔毛,裂片 5,在花蕾中覆瓦状排列;雄蕊 5,着生于花冠筒中部,花丝短,与花药近等长;花药近圆形,先端钝;子房球形,花柱短,长约达花冠筒中部。蒴果球形,5 瓣开裂达基部。

本属仅有 1 种,分布于亚洲东部。

1. 假婆婆纳(中国植物科属检索表) 图版 35: 7—8

Stimpsonia chamaedryoides Wright ex A. Gray in Mem. Acad. Sci. new ser. 6: 401. 1857-58. in adnot.; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. 22 (IV-237): 222. 1905; J. Ohwi, Fl. Jap. 927. 1956; 中国高等植物图鉴 3: 269. 图 4491. 1974; Kao et Devol in Fl. Taiwan 4: 86. 1978.

一年生草本,全体被多细胞腺毛。茎纤细,直立或上升,常多条簇生,高 6—18 厘米,不分枝或下部有少数纤细分枝。基生叶椭圆形至阔卵形,长 8—25 毫米,先端圆钝,基部圆形或稍呈心形,边缘有不整齐的钝齿;叶柄与叶片等长或较短;茎叶互生,卵形至近圆形,位于茎下部的长可达 15 毫米,向上渐次缩小成苞片状,具短柄或无柄,边缘齿较深且锐尖。花单生于茎上部苞片状的叶腋,成总状花序状;花梗长 2—8 毫米;花萼长约 2 毫米,分裂近达基部,裂片线状长圆形,先端钝或稍锐尖;花冠白色,筒部长约 2.5 毫米,喉部有细柔毛,裂片稍短于筒部,楔状倒卵形,顶端微凹;花药近圆形,长约 0.3 毫米;花柱棒状,长约 0.6 毫米,下部稍粗,先端钝。蒴果球形,直径约 2.5 毫米,比宿存花萼短。花



1—4. 琉璃繁缕 *Anagallis arvensis* L.: 1. 植株, 2. 花, 3. 花冠裂片, 示先端缘毛和雄蕊, 4. 蒴果, 5—6 河北假报春 *Cortusa matthioli* subsp. *pekinensis*. (Al. Richt.) Kitag.: 5. 植株, 6. 花的纵切面。(邓盈丰绘)