

期 4—5 月;果期 6—7 月。

产于广西、广东、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、福建、台湾。生于丘陵和低山草坡和林缘。垂直分布上限可达海拔 1000 米。日本亦有分布。

8. 点地梅属——*Androsace* L.

L. Sp. Pl. 141. 1753; Duby in DC. Prodr. 8: 47. 1844; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 632. 1873; Pax in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 4, 1: 110. 1889.

多年生或一、二年生小草本。叶同型或异型，基生或簇生于根状茎或根出条端，形成莲座状叶丛，极少互生于直立的茎上。叶丛单生、数枚簇生或多数紧密排列，使植株成为半球形的垫状体。花组成伞形花序生于花葶端，很少单生而无花葶；花萼钟状至杯状，5 浅裂至深裂；花冠白色、粉红色或深红色，少有黄色，筒部短，通常呈坛状，约与花萼等长，喉部常收缩成环状突起，裂片 5，全缘或先端微凹；雄蕊 5，花丝极短，贴生于花冠筒上；花药卵形，先端钝；子房上位，花柱短，不伸出冠筒。蒴果近球形，5 瓣裂；种子通常少数，稀多数。

属的模式种：大苞点地梅 *Androsace maxima* L.

本属约有 100 种，广布于北半球温带。我国有 71 种和 7 变种，主要产于四川、云南和西藏等省区；西北、华北、东北、华东以及华南亦有少量种类分布。

本属许多种类是典型的高山植物，植株矮小，形成密丛或垫状体，花色艳丽，适合布置岩石园或盆栽供观赏，亦有少数种类为民间草药。

本属植物的营养器官分化较为强烈，存在很大的多样性，常为分类上的重要检索性状。鉴于在前人的著作中，对这一部分的描述较为混乱，本志统一采用了下列术语：

(1) 根状茎(Rhizoma) 为植株的地下部分，具节和缩短的节间，但无正常之叶，见于莲叶点地梅 *A. henryi* Oliv. 和峨眉点地梅 *A. paxiana* R. Knuth 等种类中。

(2) 茎(Caulis) 典型的地上茎在本属中仅见于直立点地梅 *A. erecta* Maxim. (图版 53: 3) 和腋花点地梅 *A. axillaris* Franch. (图版 37: 1) 中，前者茎直立，具互生之叶以及顶生和腋生的伞形花序；后者茎初时近直立，后伸长匍匐，节上具轮生之叶和花。

(3) 纤匍枝(Sarmentum) 为自基生的叶丛中发出的无叶细长伏地枝，其顶端着地生根，发出新叶丛，成为可独立生活的新植株，如细蔓点地梅 *A. cuscutiformis* Franch. (图版 37: 2)。

(4) 根出条(Surculus) 为自叶丛中发出的枝条；枝上无叶，稀具鳞片状过渡型叶片，顶端形成新叶丛，但不生根，下一年又自此叶丛中抽出新枝和花葶，因而叶丛间通常有明显的间距。植株由多数此种枝条和叶丛形成疏丛或密丛。高山组 Sect. *Chamaejasme* Koch 的多数种类均属此类型(图版 47: 4)。

(5) 根出短枝(Cauliculus) 这一术语最早由 Franchet 用于对本属植物的描述，指的

是由根颈发出的枝条。这种枝条通常短而没有明显的节间,由新叶丛叠生于老叶丛上逐年缓慢伸长。植株常由多数此种短枝形成垫状体,如垫状点地梅 *A. tapete* Maxim. 等(图版 50: 1,7)。从形态学的角度看,此种短枝也是根出条的一种类型,但本志采用此术语以示与前一类型的区别。

分 种 检 索 表

1. 叶同型,具明显的柄;叶片基部心形,稀圆形或楔形,边缘具齿或分裂,极少全缘。
 2. 叶片圆形或肾形,基部心形(组 1. 裂叶组 Sect. *Samuelia*)
 3. 叶片基部的心形弯缺深达叶片的 $1/3-1/2$ 。
 4. 花 2—4 朵生于具叶的匍匐茎节上 1. 腋花点地梅 *A. axillaris* Franch.
 4. 花组成伞形花序,生于花葶端。
 5. 植株具鞭状纤匍枝。
 6. 花葶、纤匍枝被逆向小糙伏毛;花葶仅稍高出叶丛;纤匍枝细长,丝状 2. 细茎点地梅 *A. cuscutiformis* Franch.
 6. 花葶、纤匍枝被硬毛;花葶高出叶丛 1 倍以上,纤匍枝较粗壮,不呈丝状 3. 掌叶点地梅 *A. geraniifolia* Watt
 5. 植株无鞭状纤匍枝。
 7. 花梗长于苞片;花序伞形。
 8. 叶片边缘深裂,裂片再分裂,小裂片有齿,稀全缘。
 9. 植株较粗壮;花葶通常高出叶丛 1 倍以上。
 10. 叶柄、花葶被长而开展的硬毛;伞形花序 6—14 花 3. 掌叶点地梅 *A. geraniifolia* Watt
 10. 叶柄、花葶被短而贴伏的硬毛;伞形花序 10—25 花 4. 高葶点地梅 *A. elatior* Pax et Hoffm.
 9. 植株较细弱;花葶与叶丛等长或稍高出叶丛。
 11. 植株密被小柔毛;伞形花序 6—14 花;花葶近直立 5. 四川点地梅 *A. sutchuenensis* Franch.
 11. 植株被多细胞长柔毛;伞形花序 3—6 花;花葶披散 6. 披散点地梅 *A. gagnepainiana* Hand.-Mazz.
 8. 叶边缘分裂约达中部,裂片具齿 7. 梵净山点地梅 *A. modifissa* Chen et Y.C. Yang
 7. 花梗短于苞片;伞形花序呈头状 8. 裂叶点地梅 *A. dissecta* Franch.
 3. 叶片基部的心形弯缺深仅为叶片的 $1/3$ 或更浅。
 12. 根状茎极短或无;莲座状叶丛单生。
 13. 花萼浅裂或中裂,裂片直立或微开展。
 14. 叶片基部的心形弯缺深达叶片的 $1/4-1/3$ 。
 15. 多年生,植株粗壮;叶具重牙齿或不整齐的圆齿;花冠明显长于花萼 9. 莲叶点地梅 *A. henryi* Oliv.
 15. 一年生,植株细弱,高不超过 10 厘米;叶具 3—9 浅裂状圆齿;花冠与花萼近等长 10. 小点地梅 *A. gmelinii* (Gaertn.) Roem. et Schult.
 14. 叶片基部的心形弯缺深不超过叶片的 $1/5$ 。
 16. 花葶直立,明显高出叶丛,比花梗长 5 倍以上;果梗不反折;叶被短糙伏毛。

17. 叶柄、花萼和花梗均较粗壮,被较长的柔毛或糙伏毛;花萼被毛..... 11. 峨眉点地梅 *A. paxiana* R. Knuth.
17. 叶柄、花萼和花梗均纤细,被稀疏极短的小的刚毛;花萼近于无毛 12. 细弱点地梅 *A. gracilis* Hand.-Mazz.
16. 花萼与叶丛近等长或仅长于花梗 2—3 倍;果梗反折;叶被多细胞柔毛。
18. 植株被铁锈色柔毛;花梗长 15—20 毫米;花萼分裂约达全长的 1/3,裂片卵形 13. 贵州点地梅 *A. kouytchensis* Bonati
18. 植株被白色柔毛;花梗长 7—12 毫米;花萼分裂略超过中部,裂片三角状披针形 14. 折梗点地梅 *A. refracta* Hand.-Mazz.
13. 花萼深裂达基部,裂片呈星状展开;叶片基部浅心形..... 15. 点地梅 *A. umbellata* (Lour.) Merr.
12. 植株丛生,莲座状叶丛生于密被鳞覆枯叶柄的根出短枝上。
19. 叶片长 1—2 厘米,掌状深裂达基部,裂片再深裂,小裂片线形 16. 花叶点地梅 *A. alchemilloides* Franch.
19. 叶片长 3—5 毫米,3—5 中裂,裂片阔倒卵形,全缘或具齿..... 17. 岩居点地梅 *A. wilsoniana* Hand.-Mazz.
2. 叶片椭圆形,稀圆形,基部圆形或楔形。
20. 叶坚纸质或近革质,边缘增厚;毛被红褐色(组 2. 厚叶组 Sect. *Mirabiles*)
21. 叶圆形;花萼裂片椭圆形,具 3 脉,先端圆形..... 18. 圆叶点地梅 *A. graceae* G. Forr.
21. 叶椭圆形;花萼裂片三角形,中肋稍突起,先端具硬尖头。
22. 叶近全缘,基部截形或近圆形..... 19. 大叶点地梅 *A. mirabilis* Franch.
22. 叶缘具波状浅圆齿,基部多少下延并具羽状缺刻..... 20. 异叶点地梅 *A. runcinata* Hand.-Mazz.
20. 叶草质,边缘不增厚;毛被通常白色(组 3. 点地梅组 Sect. *Androsace*)
23. 苞片小,长 2—3 毫米;花萼长 2—2.5 毫米,果时不增大,分裂不超过中部。
24. 花萼杯状,无棱;花萼无毛;须根多数,无明显主根 21. 东北点地梅 *A. filiformis* Retz.
24. 花萼陀螺状,明显具 5 棱;花萼具短分叉毛;主根明显 22. 北点地梅 *A. septentrionalis* L.
23. 苞片大,长 5—7 毫米;花萼长 3—4 毫米,果时增大,分裂达中部或中部以下。
25. 植株被柔毛或腺毛..... 23. 大苞点地梅 *A. maxima* L.
25. 植株被柔毛并杂有分叉毛..... 24. 陕西点地梅 *A. engleri* R. Knuth
1. 叶异型或基部渐狭而无柄,边缘全缘。
26. 植株无地上茎,或仅具根出条或根出短枝;叶簇生成莲座状叶丛;花生于自叶丛中抽出的花萼端,稀单生。
27. 多年生植物;莲座状叶丛簇生或生于根出条或根出短枝端(组 4. 高山组 Sect. *Chamaejasme*)
28. 叶无软骨质的边缘或尖头。
29. 叶 2—3 型,内层叶明显长于外层叶。
30. 叶 3 型。
31. 内层叶圆形或卵形,基部圆形或截形。
32. 花萼背部具稀疏柔毛;内层叶无明显缘毛,质地薄 25. 亚东点地梅 *A. hookeriana* Klatt
32. 花萼背部近于无毛,仅具明显的短缘毛;叶两面被柔毛,边缘密被短缘毛,质地较厚

-26. 卵叶点地梅 *A. ovalifolia* Y. C. Yang
31. 内层叶长圆形、菱形或椭圆形,基部楔形,下延。
33. 花梗长于苞片 2 至数倍。
34. 内层叶大,连柄长 (2)3—10 厘米,长于中层叶 4 倍以上。
35. 花梗近于无毛;花萼分裂达全长的 1/3,裂片阔卵状三角形;花冠紫红色.....
-27. 糙伏毛点地梅 *A. strigillosa* Franch.
35. 花梗密被毛;花萼分裂达中部,裂片狭卵形;花冠白色或淡红色.....
-28. 康定点地梅 *A. limprichtii* Pax et Hoffm.
34. 内层叶小,连柄长不及 2 厘米,比中层叶长 1—1.5 倍。
36. 植株密被长达 3 毫米的白色绢状毛;外层叶早枯,无白色膜质的鞘状基部.....
-29. 绢毛点地梅 *A. nortonii* Ludlow
36. 植株被稀疏硬毛;外层叶下半部膜质,多少增宽成鞘状。
37. 根出条被刚毛状硬毛;外层叶卵状披针形,鞘状的膜质基部比叶片宽 2—3 倍.....
-30. 硬枝点地梅 *A. rigida* Hand.-Mazz.
37. 根出条被柔毛;外层叶匙形或舌形,鞘状的膜质基部与叶片宽度近相等.....
-31. 小丛点地梅 *A. minor* (Hand.-Mazz.) C. M. Hu et Y. C. Yang
33. 花梗短于苞片;花序被柔毛和头状腺体。
38. 根和根出条细瘦,木质化不明显;花冠直径 7—8 毫米;内层叶被白色长硬毛.....
-32. 腺序点地梅 *A. adenocephala* Hand.-Mazz.
38. 根和根出短枝粗壮,木质;花冠直径 4—5 毫米;内层叶密被短硬毛.....
-33. 江孜点地梅 *A. cuttingii* C. E. C. Fisch.
30. 叶 2 型。
39. 叶两面均被长 1—1.5 毫米的白色绢状毛;根出条、花萼被红褐色柔毛.....
-34. 匍茎点地梅 *A. sarmentosa* Wall.
39. 植株被绵毛、粗毛和柔毛。
40. 花冠淡黄色;苞片倒卵形或倒披针形,叶状.....35. 南疆点地梅 *A. flavescens* Maxim.
40. 花冠淡红色或紫色;苞片非上述形状。
41. 花萼高通常超过 10 厘米;花梗长于苞片 3 倍以上。
42. 内层叶具明显的柄;花萼通常单生。
43. 外层叶先端密被长绵毛;花萼分裂达全长的 1/3,背面近于无毛.....
-36. 绵毛点地梅 *A. sublanata* Hand.-Mazz.
43. 外层叶边缘具极密的多细胞粗毛和腺体;花萼分裂达中部或稍过之,上半部和边缘明显被毛.....
-37. 滇藏点地梅 *A. forrestiana* Hand.-Mazz.
42. 内层叶匙形,下部渐狭,无明显的叶柄;花萼通常 1—5 枚自叶丛中抽出.....
-38. 狭叶点地梅 *A. stenophylla* (Pettitm.) Hand.-Mazz.
41. 花萼高通常小于 7 厘米;花梗极少长达苞片的 3 倍。
44. 花冠直径小于 7 毫米或叶两面被毛,叶边缘具长短近一致的缘毛。
45. 内层叶通常长于 6 毫米,非菱形;花萼高出叶从 1 至数倍;伞形花序 (3)4—6 花。
46. 莲座状叶丛直径通常大于 2 厘米,单生或 2—3 个簇生,从中抽出花萼,无根出条.....
-38. 狭叶点地梅 *A. stenophylla* (Pettitm.) Hand.-Mazz.
46. 莲座状叶丛生于根出条端,从中抽出花萼和新根出条。
47. 莲座状叶丛直径通常小于 1.5 厘米;叶片疏被短硬毛;根出条斜倚,高出叶丛。

48. 内层叶倒卵形至近圆形;花萼遍布疏柔毛;花冠直径5—6毫米.....
..... 39. 秦巴点地梅 *A. laxa* C. M. Hu et Y. C. Yang
48. 内层叶倒披针形至窄椭圆形;花萼具5条绿色的肋,仅肋上和裂片先端被毛.....
..... 40. 绿棱点地梅 *A. mairei* Lévl.
47. 莲座状叶丛直径1.5—5.5厘米;叶片密被短硬毛和腺毛;根出条近直立,短于叶丛.....
..... 41. 粗毛点地梅 *A. wardii* W. W. Smith
45. 内层叶长可达6毫米,菱形,两面密被短硬毛;花萼短于叶丛,伞形花序2—4花.....
..... 42. 察隅点地梅 *A. zayulensis* Hand.-Mazz.
44. 花冠直径7—11毫米,内层叶腹面无毛或近于无毛,边缘具长短不一致的缘毛.....
..... 43. 大花点地梅 *A. euryantha* Hand.-Mazz.
29. 莲座状叶丛内层叶和外层叶(除有时毛被不同外)分化不明显,近等大或同型。
49. 内层叶被粗毛或短硬毛,或表面无毛仅边缘具流苏状睫毛。
50. 花2至多朵组成伞形花序。
51. 内层叶干后变褐色或枣红色;苞片椭圆形或狭长圆形。
52. 内层叶明显长于外层叶,倒卵形或阔倒披针形,宽2.5—4毫米;苞片平展.....
..... 44. 早生点地梅 *A. lehmanniana* Spreng.
52. 内层叶与外层叶近等长,狭长圆形或匙形,宽1.5—2毫米;苞片常对折成舟状。
53. 叶两面被短硬毛..... 45. 高原点地梅 *A. zambalensis* (Petitm.) Hand.-Mazz.
53. 叶边缘具睫毛,两面无毛或背面沿中肋有稀疏短硬毛.....
..... 46. 雅江点地梅 *A. yargongensis* Petitm.
51. 内层叶干后呈浅绿色或灰绿色;苞片线形至卵状长圆形。
54. 外层叶带白色,干膜质;内层叶先端钝或稍锐尖,两面无毛,边缘具稀疏睫毛.....
..... 47. 玉门点地梅 *A. brachystegia* Hand.-Mazz.
54. 外层叶褐色,草质;内层叶先端圆形,密生流苏状睫毛,腹面或背面多少被毛。
55. 内层叶片先端和边缘多少内弯;苞片1—2枚,比花梗长1倍以上.....
..... 48. 滇西北点地梅 *A. delavayi* Franch.
55. 内层叶片平展;苞片多枚,比花梗短..... 49. 柔软点地梅 *A. mollis* Hand.-Mazz.
50. 花单生。
56. 叶片披针形或狭披针形,近于无毛.....
..... 50. 唐古拉点地梅 *A. tangulashanensis* Y. C. Yang et R. F. Huang
56. 叶片舌形至椭圆形,至少边缘具睫毛。
57. 叶丛紧密叠生于根出短枝上,形成一柱状体,直径2.5—4毫米;叶长约2.5毫米,两面无毛,仅具缘毛.....
..... 51. 睫毛点地梅 *A. ciliifolia* Ludlow
57. 叶丛间多少存在间距,不连续成柱状体;叶丛直径5—8毫米;叶长2—4毫米,背面和边缘均被毛.....
..... 48. 滇西北点地梅 *A. delavayi* Franch.
49. 内层叶被白色长柔毛,通常中部以上极密,直伸成画笔状。
58. 莲座状叶丛直径至少大于3毫米,基生或生于根出条端,不形成柱状体。
59. 花2至多朵组成伞形花序;花萼明显长于花梗。
60. 花梗短于苞片或有时稍长于苞片。
61. 植株为垫状疏丛,新根出条高出叶丛1—2倍;花冠白色,后变为粉红色;苞片卵状椭圆形至狭椭圆形.....
..... 52. 天山点地梅 *A. ovezzinnikovii* Schischk. et Bobr.
61. 植株为垫状密丛;根出条的节间通常短于叶丛;花冠乳白色,喉部周围浅黄色或淡紫色;苞

- 片线形或披针状椭圆形..... 53. 白花点地梅 *A. incana* Lam.
60. 花梗长于苞片 1 倍以上。
62. 花萼高 8—15 厘米; 花梗长于苞片 5—10 倍; 叶两面密被白色绵毛状长柔毛 54. 密毛点地梅 *A. rockii* W. E. Evans.
62. 花萼高 0.5—5 厘米; 花梗长于苞片仅 1—2 倍。
63. 主根木质, 粗壮; 叶丛紧密叠生于根出短枝上; 叶背面沿中肋和边缘增厚..... 55. 昌都点地梅 *A. bisulea* Bur. et Franch.
63. 主根细, 木质化不明显; 叶丛生于根出条上; 根出条有明显的节间; 叶背面不增厚。
64. 叶片向内紧密覆叠, 使叶丛成球形; 花萼、花萼均被绢状白色长柔毛..... 56. 雪球点地梅 *A. robusta* (R. Knuth) Hand.-Mazz.
64. 叶开展或直立; 叶丛不呈球形; 花萼、花萼被柔毛..... 57. 波密点地梅 *A. pomeiensis* C. M. Hu et Y. C. Yang
59. 花 1 朵, 稀 2 朵生于花萼端; 花梗长于花萼或与花萼近等长; 莲座状叶从球形, 直径 3—6 毫米..... 58. 球形点地梅 *A. globifera* Duby
58. 莲座状叶丛直径 2—3 毫米, 紧密叠生于根出短枝上, 成一柱状体。植株由多数此种柱状体排列成半球形的坚实垫状体。
65. 根和根出短枝粗壮, 木质; 叶线形或狭长圆形; 花伸出叶丛之外, 具花梗 59. 紫花点地梅 *A. selago* Klatt
65. 根和根出短枝细瘦, 木质化不明显; 花无梗, 包藏于叶丛中..... 60. 垫状点地梅 *A. tapete* Maxim.
28. 叶(至少外层叶)具软骨质边缘或尖头。
66. 叶明显分化成 2 型。
67. 外层叶软骨质, 蜡黄色, 具刺状尖头; 内层叶草质, 无软骨质边缘, 被糙伏毛; 植株高 15—25 厘米..... 61. 刺叶点地梅 *A. spinulifera* (Franch.) R. Knuth
67. 内、外层叶均具软骨质边缘, 无毛或被柔毛。
68. 花 2 至多朵组成伞形花序, 生于花萼端。
69. 苞片非叶状, 无软骨质边缘..... 62. 西藏点地梅 *A. mariae* Kanitz
69. 苞片叶状, 具软骨质边缘..... 63. 禾叶点地梅 *A. graminifolia* C. E. C. Fisch.
68. 花单生于叶丛中, 无花萼。
70. 叶片线形或钻状披针形; 花白色..... 64. 钻叶点地梅 *A. lehmanii* Wall. ex Duby
70. 叶片长圆形; 花俯垂, 紫红色..... 65. 弯花点地梅 *A. cernuiflora* Y. C. Yang et R. F. Huang
66. 叶分化不明显或同型。
71. 外层叶卵形至阔卵形, 长 2—3.5 毫米, 外反; 叶丛间有明显间距 66. 鳞叶点地梅 *A. squarrosula* Maxim.
71. 叶线形至阔披针形, 长 5—50 毫米, 直立; 叶丛间无明显间距。
72. 花 4—8(10) 朵组成伞形花序; 花萼高 5—10 毫米..... 67. 长叶点地梅 *A. longifolia* Turcz.
72. 花单生或 2 朵生于极短的花萼端..... 68. 阿拉善点地梅 *A. alaschanica* Maxim.
27. 一或二年生植物, 植株由单个基生莲座状叶丛组成, 无根出条或根出短枝。叶匙形, 多数, 近等长, 先端近圆形, 具骤尖头(组 5. 石莲组 Sect. *Aizoidium*)
73. 花萼疏被柔毛, 无沟槽, 裂片长圆形, 先端浑圆, 边缘具较长而稍硬的髯毛; 苞片长 4—9 毫米..... 69. 景天点地梅 *A. bulleyana* G. Forr.
73. 花萼被短硬毛, 果期具不明显的沟槽, 裂片三角形, 先端多少锐尖; 苞片长 3—6 毫米.....

-70. 石莲叶点地梅 *A. integra* (Maxim.) Hand.-Mazz.
 26. 植株具明显直立的茎;叶在茎上互生;伞形花序生于茎上部叶腋(组 6. 直立组 Sect. *Orthocaulon*)
71. 直立点地梅 *A. erecta* Maxim.

点地梅属分类系统总览

组 1. 裂叶组 Sect. *Samuelia* Schlechtd. 多年生,稀一年生。根状茎通常极短,稍稍伸长且具分枝,少数种类具鞭状匍匐茎。莲座状叶丛通常单生;叶同型,草质,边缘具齿至深裂,基部心形,具长柄。花组成伞形花序生于花葶端,稀 3—5 朵生于匍匐茎的节上。

组 2. 厚叶组 Sect. *Mirabiles* (Hand.-Mazz.) Yang et Huang 多年生。根状茎极短,无匍匐茎和根出条。莲座状叶丛单生;叶同型,质地稍厚,坚纸质或近革质,全缘,具波状浅齿或羽状缺刻,基部圆形或稍下延,具明显的柄。伞形花序生于花葶端。

组 3. 点地梅组 Sect. *Androsace* 一年生。无根状茎和根出条。莲座状叶丛单生;叶同型,草质,边缘具小牙齿,基部渐狭,具短柄。花葶通常多数;花序伞形。

组 4. 高山组 Sect. *Chamaejasme* Koch 多年生。具根出条或根出短枝。莲座状叶丛生于根出条端或根出短枝端,形成疏丛、密丛或半球形的垫状体;叶 1—3 型,外层叶与内层叶的质地、毛被常不同,形状各种(极少近圆形),全缘,基部通常渐狭,无柄或仅内层叶具柄。花组成伞形花序生于花葶端,稀单生。

组 5. 石莲组 Sect. *Aizoidium* Hand.-Mazz. 二年生或多年生仅一次结实的草本。无根状茎和根出条。莲座状叶丛单生;叶同型,多数,叶片匙形,近等长,革质或坚纸质,具软骨质边缘和篦齿状缘毛。伞形花序着生于花葶端。

组 6. 直立组 Sect. *Orthocaulon* Hand.-Mazz. 一年生或二年生。具直立的地上茎。叶同型,在基部簇生,在茎上互生,近革质,具软骨质边缘。花组成腋生的伞形花序或有时单生叶腋。

组 1. 裂叶组——Sect. *Samuelia* Schlechtd. in Bot. Zeit. 504. 1856.——*Androsace* sect. *Pseudoprimula* Pax in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV. 1, 110. 1889; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. 22(IV-237): 173. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 15: 269. 1927. p. p. excl. subsect. *Mirabiles*.

多年生,稀一年生。根状茎通常极短,稍稍伸长且具分枝,少数种类具鞭状匍匐茎。莲座状叶丛通常单生;叶同型,草质,边缘具齿至深裂,基部心形,具长柄。花组成伞形花序生于花葶端,稀 3—5 朵生于匍匐茎节上。

本组有下列 17 种。

1. 腋花点地梅(中国高等植物图鉴) 图版 37: 1

Androsace axillaris (Franch.) Franch. in Journ. Bot. Morot 9: 455. 1895; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. 22(IV-237): 178. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot.