

期 4—5 月;果期 6 月。

产于四川东部(城口、巫山、巫溪)和陕西东南部(镇安)。生于山坡林下,海拔 1500—2000 米。模式标本采自四川城口。

3. 掌叶点地梅(新拟) 具蔓点地梅(西藏植物名录)

Androsace geraniifolia Watt in Journ. Linn. Soc. Bot. **20**: 16. 1882; Hook. f., Fl. Brit. Ind. **3**: 497. 1882; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 174. 1905, incl. varr.; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 273. 1927, p. p. excl. speciminibus Yunnanensibus; Gould in Hara et Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal **3**: 63. 1982.

多年生草本,无匍匐茎或有时具鞭状伸长的匍匐茎。根茎短,具多数褐色支根。叶全部基生,叶片圆形至肾圆形,直径(1.5)2—5 厘米,基部深心形,通常掌状 5—7 裂深达中部,裂片倒卵状楔形,先端具 3—5 齿或浅裂,两面被贴伏的硬毛;叶柄长(3)6—12 厘米,密被多细胞柔毛。花葶 2 至数枚自叶丛中抽出,直立,通常高出叶丛 1 倍,被开展的硬毛;苞片披针形至钻形,长 2.5—5 毫米,很少呈叶状,被硬毛;伞形花序 6—14 花;花梗长 5—10 毫米,被糙伏毛;花萼杯状,长 3—4 毫米,分裂达中部,裂片卵状披针形,被开展的硬毛;花冠白色或粉红色,直径约 7 毫米,喉部黄色,裂片倒卵状长圆形,先端近全缘。花期 5—6 月;果期 7 月。

产于西藏南部。生于山坡草地和冷杉林下,海拔 2700—3000 米。分布于锡金、不丹、尼泊尔和印度。

4. 高葶点地梅(植物分类学报) 图版 38: 1

Androsace elatior Pax et Hoffm. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **17**: 193. 1921; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 274. 1927, pro syn. sub *Androsace geraniifolia* Watt; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 215. 1986.

多年生草本。根状茎短,具多数细长的支根。叶丛外围有残存的枯叶柄;叶片肾圆形或近圆形,直径 1.5—2.5 厘米,先端近圆形,基部心形弯缺深达叶片的 1/4—1/3,边缘 5 深裂,裂片 3 浅裂,小裂片全缘或有齿,腹面被贴伏的短硬毛,深绿色,背面毛被较稀疏,淡绿色;叶柄细而稍坚硬,长(2)3—5 厘米,密被短硬毛。花葶 1—4 枚自叶丛中抽出,高 13—20 厘米,高出叶丛 2—3 倍,被短硬毛;伞形花序 10—25 花,苞片线形至长圆形,长 2—2.5 毫米,先端渐尖,花梗细而坚硬,长 1—1.5 厘米,被贴伏的硬毛;花萼杯状或阔钟状,长约 2.5 毫米,分裂达中部,裂片三角形或卵状三角形,先端锐尖,外面被短柔毛;花冠白色或粉红色,直径约 4 毫米,裂片倒卵状长圆形,近全缘。蒴果圆形,约与宿存花萼等长。花期 7 月;果期 8 月。

产于四川西北部、青海东南部(玉树)和西藏东北部(江达)。生于阴坡林下、灌丛中和湿润的石缝中,海拔 3500—4200 米。模式标本采自四川西部。