

白色,筒部与花萼近等长,裂片倒卵状心形。蒴果近陀螺形,先端近平截。 花期 4—5 月;果期 5—6 月。

产于陕西(南部)、湖北(西部)、四川、云南和西藏(东南部)。生于山坡疏林下,沟谷水边和石上。缅甸北部亦有分布。模式标本采自湖北巴东。

9b. 阔苞莲叶点地梅(变种)

var. *simulans* C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin, **24**: 218. 1986.

与原变种的主要区别,在于苞片较宽,椭圆形至倒卵状长圆形,长 4—5 毫米;花萼长 3.5—4 毫米,果时稍增大,长 5—6 毫米,裂片卵圆形,先端锐尖。

产于四川西北部(金川、马尔康、理县)。生于山谷灌丛中,海拔 2700—3100 米。

10. 小点地梅(东北植物检索表)

Androsace gmelinii (Gaertn.) Roem. et Schult. Syst. Veg. **4**: 165. 1819; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 272. 1927; Schischk. et Bobr. in Kom., Fl. URSS. **18**: 235. 1952; 东北植物检索表 274. 图版 90, 图 5. 1959. — *Cortusa gmelinii* Gaertn. Defruct. et Sem. Plant. **1**: 232. 1788.

10a. 小点地梅(原变种)

var. *gmelinii*

一年生小草本。主根细长,具少数支根。叶基生,叶片近圆形或圆肾形,直径 4—7 毫米,基部心形或深心形,边缘具 7—9 圆齿,两面疏被贴伏的柔毛;叶柄长 2—3 厘米,被稍开展的柔毛。花萼柔弱,高 3—9 厘米,被开展的长柔毛;伞形花序 2—3(5) 花;苞片小,披针形或卵状披针形,长 1—2 毫米,先端锐尖;花梗长 3—15 毫米;花萼钟状或阔钟状,长 2.5—3 毫米,密被白色长柔毛和稀疏腺毛,分裂约达中部,裂片卵形或卵状三角形,先端锐尖,果期略开张或稍反折;花冠白色,与花萼近等长或稍伸出花萼,裂片长圆形,长约 1 毫米,宽 0.5 毫米,先端钝或微凹。蒴果近球形。 花期 5—6 月。

产于内蒙古呼伦贝尔盟、大青山、乌拉山等地。生于河岸湿地、山地沟谷和林缘草甸。蒙古和苏联西伯利亚及远东地区有分布。

10b. 短葶小点地梅(变种) 图版 40: 1—3

var. *geophila* Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. **2**: 112 1926, et in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 272. 1927. — *Androsace dielsiana* R. Knuth in Engl. Jahrb. **68**: 626. 1938.

根据原始文献记载,本变种的主要特征为花萼短,高仅达 1 厘米或近于无;花梗至果期开张,长 7—25 毫米。据我们的观察,上述性状有变异。在高海拔地区(4000 米)生长的植株几乎无花萼,而随着海拔高度降低,花萼逐渐增高,以至长于花梗,但叶上毛被较疏,边缘波状圆齿较稀疏以及花梗细长等特征均较稳定,故仍保留作为变种。

产于青海、甘肃和四川西北部。生于山坡草地、阶地和沟谷中,海拔 2600—4000 米。